



Eltrombopag

Je arts heeft **eltrombopag** voorgeschreven als onderdeel van je behandeling. We geven je in deze infofiche graag meer uitleg over de werking, het verloop en mogelijke bijwerkingen van je behandeling.

Hoe werkt mijn behandeling?



Medicatie i.v.m. de bloedstolling: Je krijgt een geneesmiddel toegediend dat **een invloed heeft op de bloedstolling**.

Eltrombopag wordt gebruikt voor de **behandeling van trombocytopenie** (tekort aan bloedplaatjes). Dit geneesmiddel werkt in op TPO-R (de trombopoëetine receptor). Wanneer het bindt op deze TPO-R, zorgt dit voor het signaal in het lichaam om voorlopercellen van het beenmerg verder te laten ontwikkelen tot bloedplaatjes.

Hoe verloopt mijn behandeling?

- De afspraken voor jouw behandeling vinden steeds plaats op het **dagziekenhuis van de dienst hematologie**.
- Je afspraak verloopt als volgt:



Wat zijn mogelijke bijwerkingen van mijn behandeling?

Elke behandeling kan bijwerkingen veroorzaken. De ernst van de bijwerkingen is **afhankelijk van de gebruikte producten** en kan **individueel** verschillen. Volgende bijwerkingen zijn specifiek voor je behandeling:

- Infecties
- Hoesten
- Huiduitslag
- Vermoeidheid
- Misselijkheid
- Verminderde eetlust
- Diarree
- Droge ogen
- Oorpijn
- Rugpijn
- Verstoren van de leverwaarden

Aandachtspunten bij je behandeling:

- Het is belangrijk om te vermelden **welke andere geneesmiddelen** je neemt (ook als het gaat over voedingssupplementen, homeopathische middelen of vitaminen), want die kunnen mogelijk de werking van je behandeling beïnvloeden. Gelieve een overzicht van je thuismedicatie mee te nemen en te bespreken tijdens je volgende consultatie.
- Je neemt de pillen **eltrombopag** steeds in op **hetzelfde tijdstip** van de dag. Het is belangrijk dat je deze medicatie niet gelijktijdig met volgende producten inneemt:
 - Melkproducten
 - Supplementen zoals ijzer, calcium, magnesium, aluminium, selenium of zink
 - Antacida (vb. Gaviscon[®], Maalox[®], Rennie[®], Riopan[®],...)Wanneer je toch één van bovenstaande producten nuttigt, is het belangrijk om de pil eltrombopag **2 uur op voorhand of 4 uur nadien** in te nemen. Op deze manier wordt een goede spreiding gegarandeerd en wordt de opname van eltrombopag niet verhinderd.
- De arts zal **regelmatig een bloedafname** voorschrijven. Afhankelijk van de resultaten is het mogelijk dat de dosis voor jou aangepast zal worden.

**Contacteer je behandelend team als een van de volgende problemen optreedt:**

- Koorts van 38°C of hoger of koude rillingen
- Plots optredende en/of frequente bloedingen of blauwe plekken
- Plotse zwelling, pijn, en/of rode verkleuring van het been

Contactgegevens Hematologie

Hematologie	<input type="checkbox"/> ZAS Augustinus	<input type="checkbox"/> ZAS Cadix	<input type="checkbox"/> ZAS Palfijn
Dagziekenhuis	03 443 35 07	03 339 74 58	03 640 28 02
Verpleegafdeling	03 443 35 11	03 339 71 10	
Centraal nummer	03 443 30 11	03 217 71 11	03 640 21 11
Spoed	03 443 39 00	03 339 71 00	03 640 20 00

ZAS vzw • Kempenstraat 100, 2030 Antwerpen • BE 0862.382.656 • RPR Antwerpen
Erkenningsnummer 7/10009/31/000: ZAS Cadix, ZAS Elisabeth, ZAS Erasmus, ZAS Hoge Beuken, ZAS Joostens, ZAS Middelheim, ZAS Palfijn,
ZAS Paola, ZAS Polikliniek Regatta, ZAS UKJA • Erkenningsnummer 7/10099/38/000: ZAS Augustinus, ZAS Polikliniek Hof ter Schelde, ZAS Sint-Jozef,
ZAS Vincentius • Erkenningsnummer 7/20998/03/000: ZAS PZ Stuivenberg • Erkenningsnummer 7/25047/28/000: ZAS PVT Antwerpen