



Cemiplimab

Je arts heeft **cemiplimab** voorgeschreven als onderdeel van je behandeling. We geven je in deze infofiche graag meer uitleg over de werking, het verloop en mogelijke bijwerkingen van je behandeling.

Hoe werkt mijn behandeling?



Immuuntherapie: Je krijgt een geneesmiddel toegediend dat je **eigen immuunsysteem stimuleert om kankercellen te vernietigen**. Bij deze therapie gebruiken we **cemiplimab**.

Bepaalde tumoren gebruiken mechanismen die de afweercellen als het ware verlammen. Immuuntherapie kan die afweercellen terug activeren, zodat je immuunsysteem de kankercellen opnieuw als iets 'vreemd' gaat zien en deze cellen zal opruimen.

Hoe verloopt mijn behandeling?

- Je behandeling wordt toegediend **in het dagziekenhuis van het Oncologisch Centrum Antwerpen**.
- Je afspraak verloopt als volgt:



- Je behandeling wordt toegediend in periodes, die **cycli** worden genoemd. **1 cyclus duurt 21 dagen** met 1 toediening per cyclus. Het totaal aantal cycli wordt bepaald door je arts.

Geneesmiddel	Dag 1	Dag 2-21	Ter info
Cemiplimab			Immuuntherapie Loopt gedurende 30 minuten
Spoelvvloeistof			10 minuten spoelen van leiding, nadien verwijderen van infuus

Dit is een standaardschema. De behandel tijd en ondersteunde medicatie kan individueel wijzigen.

Wat zijn mogelijke bijwerkingen van mijn behandeling?

Elke behandeling kan bijwerkingen veroorzaken. De ernst van de bijwerkingen is **afhankelijk van de gebruikte producten** en kan **individueel** verschillen. Meer informatie over bijwerkingen en preventieve maatregelen vind je terug in de brochure 'Gids bij je kankerbehandeling met medicijnen'. Volgende bijwerkingen zijn specifiek voor je behandeling:

- Jeuk en/of huiduitslag
- Spier- en gewrichtspijn
- Auto-immuunreactie⁽¹⁾

- (1) Immuuntherapie kan een ongewenste, overdadige ontstekingsreactie veroorzaken op verschillende plaatsen in het lichaam. Dit wordt ook wel een **auto-immuunreactie** genoemd. Dit kan voorkomen op elk moment tijdens de behandeling en zelfs nadat je behandeling gestopt is. De symptomen zijn zeer variabel en ook de ernst ervan verschilt sterk. Deze auto-immuunreacties treden niet frequent op, maar als ze wel optreden, moeten ze snel worden herkend en behandeld. Specifieke auto-immuunreacties zijn:

- Hormonale verstoring (ter hoogte van de bijnieren, schildklier, hypofyse,...):
 - Hoofdpijn, overmatig zweten, snelle hartslag, gewichtsverlies of -toename, duizeligheid, gedragsveranderingen (verminderd libido, prikkelbaarheid, vergeetachtigheid,...)
- Diabetes type 1:
 - Meer dorst, vaker plassen, gewichtsverlies, vermoeidheid
- Huidreacties:
 - Ernstige huidreacties als Stevens-Johnson-syndroom (SJS), toxische epidermale necrolyse (TEN) en andere vormen van ernstige huiduitslag zijn zeldzaam. Neem onmiddellijk contact op met je behandelend team als je één van de volgende klachten hebt:
 - Blaarvorming of vervelling
 - Pijnlijke wondjes of zweren in de mond of de neus, de keel of de schaamstreek
- Longontsteking:

- Nieuwe of erger wordende hoest, kortademigheid, ...
- Darmontsteking:
 - Diarree, buikpijn, bloed in ontlasting, ...
- Leverontsteking:
 - Moeheid, gele verkleuring van het oogwit of de huid, verhoogde leverwaarden in het bloed, ...

Aandachtspunten bij je behandeling:

- Het is belangrijk om te vermelden **welke andere geneesmiddelen** je neemt (ook als het gaat over voedingssupplementen, homeopathische middelen of vitaminen), want die kunnen mogelijk de werking van je behandeling beïnvloeden. Gelieve een overzicht van je thuismedicatie mee te nemen en te bespreken tijdens je volgende consultatie.
- **Huidveranderingen:** Droge huid, huiduitslag, jeuk kunnen optreden tijdens je behandeling. We raden je aan om preventief extra zorg te dragen voor je huid: gebruik bijvoorbeeld badolie of een neutrale, niet-geparfumeerde zeep en hydrateer je huid regelmatig met een hydraterende crème.
- Een **infusiegerelateerde reactie** kan optreden tijdens de toediening van cemiplimab. Mogelijke symptomen zijn: koude rillingen, bibberen of koorts, jeuk of huiduitslag, gloeiend of gezwollen gezicht, kortademig of piepende ademhaling, duizeligheid, rug- of nekpijn, misselijkheid, braken, buikpijn. Merk je één van deze symptomen tijdens je behandeling? Waarschuw dan onmiddellijk je behandelend team.



Contacteer je behandelend team als een van de volgende problemen optreedt:

- Nieuw ontstane klachten (sinds de start van de behandeling) die langer dan 24 uur duren
- Tekens van huidreactie
- Koorts van 38°C of hoger en/of koude rillingen

Contactgegevens Oncologisch Centrum Antwerpen

Oncologisch centrum Antwerpen	☐ ZAS Augustinus	☐ ZAS Palfijn
Dagziekenhuis	Oosterveld: 03 443 36 69 Herodi: 03 443 35 07	03 640 28 02
Verpleegafdeling	03 432 60 00 (D1) 03 443 35 11 (D11)	03 640 25 61
Consultatie	03 443 37 37	03 640 28 13
Centraal nummer	03 443 30 11	03 640 21 11
Spoed	03 443 39 00	03 640 20 00

ZAS vzw • Kempenstraat 100, 2030 Antwerpen • BE 0862.382.656 • RPR Antwerpen
 Erkenningsnummer 7/10009/31/000: ZAS Cadix, ZAS Elisabeth, ZAS Erasmus, ZAS Hoge Beuken, ZAS Joostens, ZAS Middelheim, ZAS Palfijn, ZAS Paola, ZAS Polikliniek Regatta, ZAS UKJA • Erkenningsnummer 7/10099/38/000: ZAS Augustinus, ZAS Polikliniek Hof ter Schelde, ZAS Sint-Jozef, ZAS Vincentius • Erkenningsnummer 7/20998/03/000: ZAS PZ Stuivenberg • Erkenningsnummer 7/25047/28/000: ZAS PVT Antwerpen