Carboplatine-paclitaxel

Je arts heeft **carboplatine-paclitaxel** voorgeschreven als onderdeel van je behandeling. We geven je in deze infofiche graag meer uitleg over de werking, het verloop en mogelijke bijwerkingen van je behandeling.

Hoe werkt mijn behandeling?



Chemotherapie: Je krijgt 2 geneesmiddelen, carboplatine en paclitaxel, toegediend die de **celdeling afremmen** en zo vooral sneldelende cellen, zoals **kankercellen, beschadigen**. Deze geneesmiddelen worden ook cytostatica of celremmende geneesmiddelen genoemd

Hoe verloopt mijn behandeling?

- Je behandeling wordt toegediend **op de verpleegafdeling van het Oncologisch Centrum Antwerpen.**
- Je afspraak verloopt als volgt:



- Je behandeling wordt toegediend in periodes, die **cycli** worden genoemd. **1 cyclus duurt 21 dagen** en omvat een opname op de verpleegafdeling met 1 overnachting. Het totaal aantal cycli wordt bepaald door je arts.
- Hieronder geven we je een overzicht van je behandelschema.

Geneesmiddel	Dag -1	Dag 1	Dag 2	Ter info
Dexamethasone 8mg				Tegen misselijkheid en allergische reacties Inname van 1 capsule de avond vooraf (20u)
Dexamethasone 8mg Netupitant 300mg + palonosetron 0.5mg Cetirizine 10mg				Tegen misselijkheid en allergische reacties Inname minstens 1 uur voor start van chemo
Spoelvloeistof				*Ter bescherming van de nieren*
Paclitaxel				**Chemo** Loopt gedurende 3 uur
Spoelvloeistof				*10 minuten spoelen van leiding*
Carboplatine				**Chemo** Loopt gedurende 1 uur
Spoelvloeistof				*10 minuten spoelen van leiding*

Dit is een standaardschema. De behandeltijd en ondersteunende medicatie kan individueel wijzigen.

Wat zijn mogelijke bijwerkingen van mijn behandeling?

Elke behandeling kan bijwerkingen veroorzaken. De ernst van de bijwerkingen is afhankelijk van de gebruikte producten en kan individueel verschillen. Meer informatie over bijwerkingen en preventieve maatregelen vind je terug in de brochure 'Gids bij je kankerbehandeling met medicijnen'. Volgende bijwerkingen zijn specifiek voor je behandeling:

- Misselijkheid en braken
- Minder witte bloedcellen: verhoogde vatbaarheid voor infecties
- Minder rode bloedcellen (bloedarmoede)
- Ontstoken mondslijmvlies en droge mond
- Diarree en constipatie
- Haarverlies
- Tintelingen of voos gevoel in vingers/tenen
- Nagelveranderingen
- Allergische of overgevoeligheidsreacties
- Ongewone vermoeidheid
- Irritatie van slijmvliezen van ogen (bv. tranende ogen) en neus (bv korstvorming en soms bloedverlies bij snuiten)
- Smaak- en reukveranderingen
- Spierpijn
- Minder bloedplaatjes: risico op bloedingen

Aandachtspunten bij je behandeling:

- Het is belangrijk om te vermelden **welke andere geneesmiddelen** je neemt (ook als het gaat over voedingssupplementen, homeopathische middelen of vitaminen), want die kunnen mogelijk de werking van je behandeling beïnvloeden. Gelieve een overzicht van je thuismedicatie mee te nemen en te bespreken tijdens je volgende consultatie.
- Een **overgevoeligheidsreactie** kan optreden tijdens het toedienen van paclitaxel. Mogelijke symptomen zijn huiduitslag, roodheid van het gelaat, een gevoel van benauwdheid, snelle hartslag, lage bloeddruk, koorts of rillingen, lage rugpijn. Ter preventie wordt een voorbehandeling met dexamethasone en cetirizine voorzien. Merk je toch één van deze symptomen tijdens je behandeling? Waarschuw dan onmiddellijk je behandelend team.
- Tijdens de behandeling kunnen we door middel van 'compressietherapie' de bloedvaten doen samentrekken waardoor de medicatie minder diep kan doordringen. Hierdoor wordt de kans op nagelveranderingen en nagelbeschadiging en neuropathie (tintelingen of voos gevoel in vingers/tenen) verminderd, Bij gebruik van compressietherapie, krijg je 2 paar stevig aansluitende handschoenen aan gedurende de toediening van paclitaxel. Aan de voeten werken we met koude-therapie omwille van hetzelfde principe.
- Paclitaxel: Als dit geneesmiddel onbedoeld buiten het bloedvat terechtkomt (ook '**extravasatie**' genoemd), kan het weefselschade veroorzaken. Merk je pijn en/of een zichtbare zwelling op tijdens de toediening? Waarschuw dan onmiddellijk je behandelend team.



Contacteer je behandelend team als een van de volgende problemen optreedt:
Koorts van 38°C of hoger of koude rillingen. Chemotherapie veroorzaakt een daling van de witte bloedcellen waardoor je vatbaarder en minder weerbaar bent tegen infecties. Bij koorts (temperatuur van 38°C of hoger) of koude rillingen is contact met het behandelteam aangewezen om een bloedname en nazicht in het ziekenhuis te organiseren.

Contactgegevens Oncologisch Centrum Antwerpen

Oncologisch centrum Antwerpen	☐ ZAS Augustinus	☐ ZAS Palfijn
Dagziekenhuis	03 443 36 69	03 640 28 06
Verpleegafdeling	03 443 35 11 (D11) 03 443 35 02 (D2)	03 640 25 61
Consultatie	03 443 37 37	03 640 28 13
Centraal nummer	03 443 30 11	03 640 21 11
Spoed	03 443 39 00	03 640 20 00

Erkenningsnummer 7/10009/31/000: ZAS Cadix, ZAS Elisabeth, ZAS Erasmus, ZAS Hoge Beuken, ZAS Joostens, ZAS Middelheim, ZAS Palfijn, ZAS Paola, ZAS Polikliniek Regatta, ZAS UKJA • Erkenningsnummer 7/10099/38/000: ZAS Augustinus, ZAS Polikliniek Hof ter Schelde, ZAS Sint-Jozef,ZAS Vincentius • Erkenningsnummer 7/20998/03/000: ZAS PZ Stuivenberg • Erkenningsnummer 7/25047/28/000: ZAS PVT Antwerpen