



Fruquintinib

Je arts heeft **fruquintinib** voorgeschreven als onderdeel van je behandeling. We geven je in deze infofiche graag meer uitleg over de werking, het verloop en mogelijke bijwerkingen van je behandeling.

Hoe werkt mijn behandeling?



Doelgerichte therapie: Je krijgt een geneesmiddel toegediend dat **doelgericht op zoek gaat naar bepaalde eiwitten** in het lichaam.

Fruquintinib is specifiek gericht tegen **de VEGFR (Vasculaire Endotheliale Groeifactor Receptor)**. Door het blokkeren van deze VEGFR, kunnen er geen nieuwe bloedvaten gevormd worden binnen de kanker. Bijgevolg kunnen er ook geen extra voedingsstoffen of zuurstofmoleculen meer naar de kankercellen gevoerd worden. Dit zal de groei van kanker verstoren en vertragen.

Hoe verloopt mijn behandeling?

- De **behandeling** wordt toegediend op het **dagziekenhuis van het Oncologisch Centrum Antwerpen**.
- Je afspraak verloopt als volgt:



- Dosis: Er bestaan 2 verschillende dosissen fruquintinib: 1mg en 5mg. Je arts vertelt je welke dosis je dagelijks moet nemen. Dit is medicatie die je via het dagziekenhuis mee naar huis krijgt.
- Je behandeling wordt toegediend in periodes, die **cycli** worden genoemd. Een cyclus duurt **28 dagen**.

Tijdens de **eerste 21 dagen van de cyclus** wordt er steeds één (of meerdere) capsule(s) **fruquintinib** ingenomen. De laatste 7 dagen van de cyclus wordt er een **rustweek** ingelast voor deze capsules. De dosis wordt individueel bepaald.

Fruquintinib

Week 1:	1	2	3	4	5	6	7
Week 2:	8	9	10	11	12	13	14
Week 3:	15	16	17	18	19	20	21
Week 4:	22	23	24	25	26	27	28
	/	/	/	/	/	/	/

Wat zijn mogelijke bijwerkingen van mijn behandeling?

Elke behandeling kan bijwerkingen veroorzaken. De ernst van de bijwerkingen is **afhankelijk van de gebruikte producten** en kan **individueel** verschillen. Volgende bijwerkingen zijn specifiek voor je behandeling:

- Verhoging van de bloeddruk
- Eiwitverlies in de urine
- Ontstoken mondslijmvlies
- Hand-voetsyndroom
- Minder bloedplaatjes: risico op bloedingen
- Vermoeidheid
- Diarree
- Gewichtsverlies
- Verminderde eetlust
- Stemveranderingen, heesheid
- Skelet- en/of gewrichtspijn
- Verminderde werking van de schildklier
- Minder witte bloedcellen: verhoogd risico op infecties
- Verhoogde leverwaarden (zichtbaar in bloed)

Aandachtspunten bij je behandeling:

- Het is belangrijk om te vermelden **welke andere geneesmiddelen** je neemt (ook als het gaat over voedingssupplementen, homeopathische middelen of vitaminen), want die kunnen mogelijk de werking van je behandeling beïnvloeden. Gelieve een overzicht van je thuismedicatie mee te nemen en te bespreken tijdens je volgende consultatie.
- Je neemt de capsules **fruquintinib** steeds op **hetzelfde tijdstip** van de dag. Dit kan zowel met als zonder voedsel ingenomen worden. Het is belangrijk dat er niet wordt gekauwd op de capsules. Daarnaast mag je ze ook niet openen of oplossen. Ben je een **dosis vergeten?** Dan mag je deze nog inhalen tot 12 uur na het gewoonlijke tijdstip. Wanneer een dosis meer dan 12 uur vergeten wordt, moet deze worden overgeslagen. De dag nadien ga je verder op het gewoonlijke tijdstip.
- Bij deze medicatie zien we vaak dat er een verhoging van de bloeddruk optreedt. We vragen dan ook om jouw **bloeddruk thuis op te volgen**. Wanneer de bloeddruk te hoog wordt, is het mogelijk dat er bloeddrukverlagende medicatie wordt opgestart of dat de dosis van fruquintinib verlaagd wordt.
- Deze medicatie kan een verlies van **eiwitten in de urine** geven (ook proteïnurie genoemd). Je zal daarom bij de start van de behandeling en op regelmatige tijdstippen gedurende de behandeling een urinestaal moeten geven. Met een urinedipstick test kijken we dan hoeveel eiwitten er in je urine zitten. Zo volgen we deze bijwerking nauw op.
- **Ontstoken mondslijmvlies en droge mond:** zorg preventief voor een goede mondhygiëne. Indien je toch last hebt van een ontstoken mondslijmvlies, kan je arts een verzachtende mondspoeling of lasertherapie aanraden.
- **Hand-voet-syndroom:** Fruquintinib kan een bijwerking geven met roodheid, zwelling en pijn op de handpalmen en voetzolen. Ter preventie raden we aan: gebruik 2x/dag een hydraterende, verzachtende crème op handpalmen en voetzolen, vermijd strakke schoenen en niet te lang of te warm baden. Gebruik bij voorkeur een neutrale douche-olie (ipv geparfumeerde zepen).
- Deze medicatie kan in zeldzame gevallen ernstige bijwerkingen veroorzaken zoals een bloeding in de maag of darmen of een perforatie in de maag- of darmwand. Neem onmiddellijk contact op met je behandelend team als je last hebt van één van volgende klachten: bloed in stoelgang of zwarte ontlasting, bloed in de urine, hevige buikpijn, bloed ophoesten/braken.



Contacteer je behandelend team als een van de volgende problemen optreedt:

- Plots optredende en/of frequente bloedingen of blauwe plekken
- Ongewone hoofdpijn
- Tekens van een bloeding of perforatie in maag/darmen: bloed in stoelgang, urine of bloed ophoesten/braken, hevige buikpijn.
- Koorts van 38°C of hoger en/of koude rillingen.
- Meer dan 48 uur diarree
- Extreme vermoeidheid of kortademigheid

Contactgegevens Oncologisch Centrum Antwerpen

Oncologische centrum Antwerpen	<input type="checkbox"/> ZAS Augustinus	<input type="checkbox"/> ZAS Palfijn
Dagziekenhuis	Heodi: 03 443 35 07 Oosterveld: 03 443 36 69	03 640 28 02
Verpleegafdeling	03 432 60 00 (D1) 03 443 35 11 (D11)	03 640 25 61

Consultatie	03 443 37 37	03 640 28 13
Centraal nummer	03 443 30 11	03 640 21 11
Spoed	03 443 39 00	03 640 20 00

ZAS vzw • Kempenstraat 100, 2030 Antwerpen • BE 0862.382.656 • RPR Antwerpen
Erkenningsnummer 7/10009/31/000: ZAS Cadix, ZAS Elisabeth, ZAS Erasmus, ZAS Hoge Beuken, ZAS Joostens, ZAS Middelheim, ZAS Palfijn,
ZAS Paola, ZAS Polikliniek Regatta, ZAS UKJA • Erkenningsnummer 7/10099/38/000: ZAS Augustinus, ZAS Polikliniek Hof ter Schelde, ZAS Sint-Jozef,
ZAS Vincentius • Erkenningsnummer 7/20998/03/000: ZAS PZ Stuivenberg • Erkenningsnummer 7/25047/28/000: ZAS PVT Antwerpen