



Pijnmedicatie

Informatie voor ouders





Beste ouder of verantwoordelijke

Je kind heeft pijnmedicatie nodig. Met deze brochure willen we je uitleggen wat dat precies inhoudt en hoe de behandeling verloopt.

Hebben jij of je naasten nog vragen na het lezen van deze brochure? Schrijf ze dan op en neem ze mee naar je volgende afspraak. Je arts of verpleegkundige zal ze beantwoorden.

Vriendelijke groeten

Het team van de afdeling (kinder)spoed



Heb je een fout gezien in een brochure?
Meld het ons via zas.be/fout-in-brochure

Wat is pijnmedicatie?

01

Welke pijnmedicatie heeft je kind nodig?

02

Wat is pijnmedicatie?

Pijnmedicatie vermindert de pijn die je kind voelt bij een aandoening of tijdens een behandeling.

Er zijn verschillende soorten pijnmedicatie. Bespreek met je arts welke medicatie je kind nodig heeft en in welke dosis.

Welke pijnmedicatie heeft je kind nodig?

02

Kinderen geef je meestal medicatie in de vorm van siroop om te drinken of een zetpil (suppo) in de poep. Siroop werkt beter, dus dat is de eerste keuze. Als je kind moet overgeven, gebruik je beter een zetpil. De siroop braakt je kind anders terug op.

Het is belangrijk om je kind de juiste dosis te geven. Gebruik daarom altijd de pipet of doseerlepel die bij de siroop zit. Hoeveel medicatie je kind precies nodig heeft, hangt af van het gewicht van je kind.

Als je kind allergieën, leverproblemen of nierproblemen heeft, bespreek je met je arts welke medicatie je mag geven.

Administratief

De eerste keuze voor pijnmedicatie is paracetamol. Het wordt ook soms Dafalgan, Perdolan of Panadol genoemd. Het vermindert pijn en koorts.

Geef telkens een dosis van 15 mg per kg lichaamsgewicht. Paracetamol mag je maximaal 4 keer per dag geven en je moet 6 uur tussen iedere dosis laten.

Ibuprofen

De tweede keuze voor pijnmedicatie is ibuprofen. Het wordt ook Brufen of Nurofen genoemd. Het is een ontstekingsremmer die pijn en koorts vermindert. Geef telkens een dosis van 10 mg per kg lichaamsgewicht. Ibuprofen mag je maximaal 3 keer per dag geven en je moet 8 uur tussen iedere dosis laten.

Ibuprofen geef je enkel als paracetamol niet genoeg helpt tegen de pijn. Je kan beide middelen ook afwisselend geven. Als de pijn vermindert, verminder je ook de medicatie. Bouw dan eerst de ibuprofen af. Let op: gebruik ibuprofen niet bij kinderen jonger dan 3 maanden of onder 6 kg. Gebruik het ook niet als je kind last heeft van uitdroging, een maagontsteking of een stollingsstoornis.

Laat je kind genoeg drinken als je ibuprofen geeft.

ZIEKENHUIS aan de STROOM

Contactgegevens:

ZAS Augustinus:	03 443 39 00
ZAS Cadix:	03 339 71 00
ZAS Middelheim:	03 280 40 52
ZAS Palfijn:	03 640 20 00
ZAS Vincentius:	03 285 20 00
ZAS Kaai 142:	03 543 92 40
ZAS Sint-Jozef:	03 444 13 10