



Provocatietesten voor medicatie-allergie

Informatiebrochure voor patiënten





ZIEKENHUISaan
de STROOM

Beste patiënt,

Je hebt met je arts besproken dat het nodig is om te achterhalen of je allergisch bent voor bepaalde medicatie. Dat gebeurt aan de hand van provocatietesten. In deze brochure lees je hoe dat werkt.

Heb je vragen of opmerkingen?

Schrijf ze op en breng ze mee op bij je volgende raadpleging. Je arts en/of de hartfalenverpleegkundige beantwoorden graag je vragen.

Vriendelijke groeten

De diëtisten van Hartcentrum ZNA

Erkenningsnummer 009: ZAS Cadix, ZAS Elisabeth, ZAS Erasmus, ZAS Hoge Beuken, ZAS Joostens, ZAS Middelheim, ZAS Palfijn, ZAS Paola (Kinderziekenhuis), ZAS UKJA (Universitaire Kinder- en Jeugdpsychiatrie Antwerpen) **Erkenningsnummer 099:** ZAS Augustinus, ZAS Sint-Jozef, ZAS Vincentius **Erkenningsnummer 998:** ZAS PZ Stuivenberg (Psychiatrisch Ziekenhuis) **Erkenningsnummer 039:** ZAS PVT Antwerpen (Psychiatrisch Verzorgingstehuis) **Zijn ook deel van ZAS:** Medisch Centrum Kaai 142, ZAS Polikliniek Hof ter Schelde, ZAS Polikliniek Regatta, ZAS Plantin, ZAS Magazijn Luchtbal, ZAS Magazijn Terbeke

Hoe werkt een provocatietest voor medicatie-allergie?

01

Vorbereiding op de huidtest

02

Hoe verlopen de allergietesten?

03

Resultaat van de testen

04

Wat zijn mogelijke nevenwerkingen of complicaties?

05

Compliment, suggestie of klacht?

06

Hoe werkt een provocatietest voor medicatie-allergie?

Bij een provocatietest neem je specifieke medicatie oraal in en controleren we of je een (allergische) reactie hebt op de medicatie. De test gebeurt in meerdere stappen. Je begint altijd met een lage dosis die per stap een beetje wordt verhoogd. Als je een reactie hebt, dan is die dus milder dan wanneer je meteen een volledige dosis zou nemen.

Meestal dient deze test om een allergie te ontkrachten, en dus als bewijs dat je de medicatie in de toekomst (terug) veilig kan innemen.



Tijdens een consultatie op voorhand bespreken we welke medicatie we testen. Je krijgt uitleg over de testen en over de mogelijke risico's. Meestal doen we eerst huidtesten voordat we overgaan tot een provocatietest.

Wat moet je op voorhand doen?

- Praat met je arts over de medicatie die je neemt. Neem je specifieke medicatie voor hart- en vaatziekten? Dan moet je 24 uur voor de provocatietest stoppen met die medicatie. Doe dat altijd in overleg met je arts en je cardioloog. Het gaat om deze types van medicatie:
 - **bètablokkers** zoals emconcor, inderal en bisoprolol
 - **bloeddrukverlagers** zoals coversyl en diltiazem
- Je hoeft niet nuchter te zijn voor de testen.

Hoe verlopen de allergietesten?

De allergietesten gebeuren ambulantly. Je hoeft dus niet in het ziekenhuis te overnachten. De testen gaan meestal door in het dagziekenhuis.



- Je **meldt je aan** in de inkomhal van het ziekenhuis voor het dagziekenhuis.



- De verpleegkundige prikt **een infuus**. Dat dient om meteen te kunnen ingrijpen als je sterk reageert op de testen.



- Je neemt plaats in een comfortabele zetel. **Maak het je gemakkelijk**, want de testen duren kunnen 1 tot 4 uur duren.



- We **meten je bloeddruk en hartslag** bij het begin van de testen en tijdens het onderzoek.
- Bij de provocatietesten neem je een lage dosis van een specifieke medicatie oraal in. Daarna wachten we ongeveer 30 minuten af of je erop reageert. Reageer je niet? Dan gaat de test verder met een iets hogere dosis. In totaal verhogen we de dosis in 2 tot 6 stappen. Daardoor kan de test in totaal een paar uur duren.
- Soms krijg je de **medicatie** niet oraal toegediend, maar via een infuus.

Resultaat van de testen

Na de testen bespreekt de arts de bevindingen met jou. Als er bewijs is dat je een allergie hebt, krijg je een allergiekaartje. Daarop staat de medicatie waarvoor je allergisch bent. Je allergiegegevens worden ook aangepast in je ZAS-patiëntendossier. Je huisarts en verwijzende arts krijgen een verslag van de bevindingen.



Wat zijn mogelijke nevenwerkingen of complicaties?

Als de **provocatietest** een reactie uitlokt, dan krijg je symptomen die lijken op **allergische klachten**: neussloop, jeuk, huiduitslag en zwelling van de lippen. Omdat de test begint met een lage dosis, is je eerste reactie **meestal vrij mild**.

De kans bestaat altijd dat je **een sterkere reactie** hebt, bijvoorbeeld met zwelling van de keel, kortademigheid of een bloeddrukval. Daarom voeren we deze testen bijna altijd uit in het dagziekenhuis. Zo kunnen we meteen ingrijpen en je via het infuus medicatie geven om de reactie te stoppen. Er is **altijd noodmedicatie** bij de hand.

Meestal gaan we pas over op provocatietesten als we je reactie al getest hebben met een huidtest. De huidtest dient om de risico's van een provocatietest beter in te schatten, maar dat is niet voor elke soort medicatie mogelijk.

Compliment, suggestie of klacht?

De artsen en verpleegkundigen van Longziekten en Allergie, ZAS Augustinus willen je verblijf zo aangenaam mogelijk maken.

Heb je vragen, opmerkingen of suggesties?

Dan horen wij dit graag van jou.

Meld ze aan jouw arts of verpleegkundige.

Wij zijn er om jou te helpen.

Of contacteer de **ZAS Ombudsdienst** via **03 280 80 82**
of **ombudsdienst@zas.be**.



Handwriting practice lines consisting of 20 horizontal dotted lines.

ZIEKENHUIS aan de STROOM

Contactgegevens:

Dr. Sebastiaan Tuyls
Longziekten – Allergie
allergie@zas.be

03 443 41 28

Contactadres:

ZAS Augustinus
Oosterveldlaan 24
2610 Wilrijk

03 443 35 57 secretariaat longziekten
augustinus@zas.be

www.zas.be