



Sacituzumab govitecan (Trodelvy®)

Je arts heeft **sacituzumab govitecan (Trodelvy®)** voorgeschreven als onderdeel van je behandeling. We geven je in deze infofiche graag meer uitleg over de werking, het verloop en mogelijke bijwerkingen van je behandeling.

Hoe werkt mijn behandeling?



Antilichaam-geneesmiddelconjugaat: Een celremmend geneesmiddel wordt rechtstreeks aan kankercellen afgegeven. Het bestaat uit 2 belangrijke delen:

Sacituzumab is een **antilichaam** dat zich specifiek het Trop-2-eiwit op bepaalde kankercellen (bv op het oppervlak van borstkankercellen) zal herkennen en zich hieraan zal binden.

Govitecan is een **celremmend geneesmiddel** om kankercellen te vernietigen of de groei van kankercellen af te remmen.

Hoe verloopt mijn behandeling?

- Je behandeling wordt toegediend in het **dagziekenhuis Oncologisch Centrum Antwerpen**
- Je afspraak verloopt als volgt:



- Je behandeling wordt toegediend in periodes, die **cycli** worden genoemd. **1 cyclus duurt 21 dagen met 2 toedieningen per cyclus (op dag 1 en dag 8), gevolgd door 1 rustweek.** Het totaal aantal cycli wordt bepaald door je arts.
- Hieronder geven we je een overzicht van je behandel-schema.

Cyclus van 21 dagen	Geneesmiddel	Dag 1	Dag 2-7	Dag 8	Dag 9-21	Ter info
	Spoelvloeistof					Voorspoeling
	Palonosetron 250µg					Tegen misselijkheid en braken.
	Dexamethasone 8mg					Tegen allergische reacties en misselijkheid.
	Cetirizine 10mg					Tegen allergische reacties
	Paracetamol 1g					Tegen pijn en koorts (ikv allergische reactie).
	Sacituzumab govitecan (Trodelvy®)					Antilichaam-geneesmiddelconjugaat Eerste infuus loopt gedurende 3 uur. Als dit goed verloopt, kan vanaf de tweede cyclus het infuus over 1 uur gegeven worden.
	Spoelvloeistof					30 minuten spoelen van infuusleiding. Nadien verwijderen van infuus.

Dit is een standaardschema. De behandel-tijd en ondersteunde medicatie kan individueel wijzigen

Wat zijn mogelijke bijwerkingen van mijn behandeling?

Elke behandeling kan bijwerkingen veroorzaken. De ernst van de bijwerkingen is afhankelijk van de gebruikte producten en kan individueel verschillen. Meer informatie over bijwerkingen en preventieve maatregelen vind je terug in de brochure 'Gids bij je kankerbehandeling met medicijnen'. Volgende bijwerkingen zijn specifiek voor je behandeling:

- Misselijkheid en braken
- Diarree
- Minder witte bloedcellen: verhoogde vatbaarheid voor infecties
- Ongewone vermoeidheid
- Haarverlies
- Minder rode bloedcellen (bloedarmoede)
- Constipatie
- Verminderde eetlust
- Hoesten
- Buikpijn
- Allergische of overgevoelheidsreactie

Aandachtspunten bij je behandeling:

- Het is belangrijk om te vermelden **welke andere geneesmiddelen** je neemt (ook als het gaat over voedingssupplementen, homeopathische middelen of vitaminen), want die kunnen mogelijk de werking van je behandeling beïnvloeden. Gelieve een overzicht van je thuismedicatie mee te nemen en te bespreken tijdens je volgende consultatie.
- Een **overgevoelheidsreactie** kan voorkomen tijdens de toediening van Trodelvy. Mogelijke symptomen zijn huiduitslag, roodheid van het gelaat, een gevoel van benauwdheid, snelle hartslag, lage bloeddruk, koorts of rillingen. Ter preventie wordt steeds een voorbehandeling met dexamethasone, cetirizine en paracetamol voorzien. De eerste toediening wordt gegeven over een lagere snelheid (over 3 uur), indien goed verdragen kan vanaf de tweede toediening het infuus over 1 uur gegeven worden. Je zal steeds tot 30 minuten na toediening in observatie blijven. Merk je toch één van deze symptomen tijdens je behandeling? Waarschuw dan onmiddellijk je behandelend team.



Contacteer je behandelend team als een van de volgende problemen optreedt:

Koorts van 38°C of hoger of koude rillingen. Trodelvy kan een daling van de witte bloedcellen veroorzaken, waardoor je vatbaarder en minder weerbaar bent tegen infecties. Bij koorts (temperatuur van 38°C of hoger) of koude rillingen is contact met het behandelteam aangewezen om een bloedname en nazicht in het ziekenhuis te organiseren.

Contactgegevens Oncologisch Centrum Antwerpen

Oncologisch centrum Antwerpen	☐ ZAS Augustinus	☐ ZAS Middelheim	☐ ZAS Palfijn
Dagziekenhuis	03 443 36 69	03 280 40 12	03 640 28 02
Verpleegafdeling	03 443 35 01 (D1) 03 443 35 02 (D2)		03 640 25 61
Consultatie	03 443 37 37	03 280 34 03	03 640 28 13
Centraal nummer	03 443 30 11	03 280 31 11	03 640 21 11
Spoed	03 443 39 00	03 280 22 13	03 640 20 00