



Kd (Carfilzomib + Dexamethasone)

Je arts heeft **Kd** voorgeschreven als onderdeel van je behandeling. Deze behandeling bestaat uit carfilzomib (inфуus) en dexamethasone (capsules). We geven je in deze infofiche graag meer uitleg over de werking, het verloop en mogelijke bijwerkingen van je behandeling.

Hoe werkt mijn behandeling?



Doelgerichte therapie: Je krijgt een geneesmiddel toegediend dat **doelgericht op zoek gaat naar bepaalde cellen** in het lichaam.

Carfilzomib is een **proteasoomremmer**. Het bindt zich in kankercellen aan een specifiek eiwit (het proteasoom) en blokkeert zo de werking van dit eiwit. Daardoor stapelen afvalstoffen op in de kankercel en zullen de cellen afsterven.

Hoe verloopt mijn behandeling?

- De **behandelingen** worden toegediend in het **dagziekenhuis** van de dienst hematologie.
- Je afspraak verloopt als volgt:



- Je behandeling wordt toegediend in periodes, die **cycli** worden genoemd. Een cyclus duurt **28 dagen** en er zijn **6 toedieningen** per cyclus. Het totaal aantal cycli wordt steeds individueel bepaald door jouw arts.
- Hieronder geven we je een overzicht van je **behandelschema**. Dit is een standaardschema. De behandeltijd en ondersteunende medicatie kan individueel wijzigen.

| Cyclus 1-12 | Geneesmiddel | Dag 1 | Dag 2 | Dag 8 | Dag 9 | Dag 15 | Dag 16 | Dag 22 | Dag 23 | Ter info |
|-----------------|--------------------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|---|
| | Dexamethasone 20mg | | | | | | | | | Voorkomen van allergische reactie Inname minstens 1 uur voor de therapie Cortisone vermindert ook het volume van de tumor |
| | Spoelvoeistof | | | | | | | | | Traag inlopend waakinfuus |
| | Carfilzomib | | | | | | | | | Therapie Intraveneuze toediening over 30 minuten |
| | Spoelvoeistof | | | | | | | | | Naspoelen van de leidingen |
| Vanaf cyclus 13 | Geneesmiddel | Dag 1 | Dag 2 | Dag 8 | Dag 9 | Dag 15 | Dag 16 | Dag 22 | Dag 23 | Ter info |
| | Dexamethasone 20mg | | | | | | | | | Voorkomen van allergische reactie Inname minstens 1 uur voor de therapie Cortisone vermindert ook het volume van de tumor |
| | Spoelvoeistof | | | | | | | | | Traag inlopend waakinfuus |
| | Carfilzomib | | | | | | | | | Therapie Intraveneuze toediening over 30 minuten |
| | Spoelvoeistof | | | | | | | | | Naspoelen van de leidingen |

Wat zijn mogelijke bijwerkingen van mijn behandeling?

Elke behandeling kan bijwerkingen veroorzaken. De ernst van de bijwerkingen is **afhankelijk van de gebruikte producten** en kan **individueel** verschillen. Volgende bijwerkingen zijn specifiek voor je behandeling:

- Minder witte bloedcellen: verhoogd risico op infecties
- Minder rode bloedcellen: vermoeidheid
- Minder bloedplaatjes: risico op bloedingen
- Misselijkheid en braken
- Smaak- en reukveranderingen
- Constipatie of diarree
- Schommelingen van de bloeddruk
- Vochtophoping in de benen
- Hoofdpijn
- Kortademigheid / benauwd gevoel
- Tintelingen of voos gevoel in de vingers/tenen
- Spier- en gewrichtspijn
- Stemmingsstoornissen
- Overgevoeligheidsreactie
- Ontregelde bloedsuikerspiegel
- Slapeloosheid

Aandachtspunten bij je behandeling:

- Het is belangrijk om te vermelden **welke andere geneesmiddelen** je neemt (ook als het gaat over voedingssupplementen, homeopathische middelen of vitaminen), want die kunnen mogelijk de werking van je behandeling beïnvloeden. Gelieve een overzicht van je thuismedicatie mee te nemen en te bespreken tijdens je volgende consultatie.
- We raden je aan om na je behandeling voldoende **water te drinken**. Tijdens de **eerste cyclus** krijg je ook **extra vocht** toegediend gedurende 1 uur voor én na de behandeling. Dit zorgt ervoor dat de eerste afspraken wat meer tijd in beslag zullen nemen. Als jouw nierfunctie goed is, zijn deze spoelinfusen niet meer noodzakelijk vanaf cyclus twee.
- De behandeling kan een schommeling van de **bloeddruk** veroorzaken. Daarom zal jouw bloeddruk regelmatig gecontroleerd worden tijdens de afspraken op het dagziekenhuis. Daarnaast adviseren we om jouw bloeddruk thuis ook goed op te volgen en deze te noteren. Merk je een verhoging van jouw bloeddruk? Meld dit dan steeds aan jouw behandelende arts tijdens de volgende consultatie.
- Meestal wordt er bij deze behandeling ook **co-medicatie** opgestart:

- Pantoprazole 20mg
- Aciclovir 800mg

- 1 x per dag 1 tablet (nuchter)
- 2 x per dag ½ tablet

- Maagbeschermer
- Preventie virale infectie (vb. zona)



Contacteer je behandelend team als een van de volgende problemen optreedt:

- Koorts van 38°C of hoger en/of koude rillingen.
- Meer dan 24 uur hevig braken
- Meer dan 48 uur diarree
- Plots optredende en/of frequente bloedingen of blauwe plekken
- Ongewone hoofdpijn
- Extreme vermoeidheid of kortademigheid

Contactgegevens Hematologie

| Hematologie | <input type="checkbox"/> ZAS Augustinus | <input type="checkbox"/> ZAS Cadix | <input type="checkbox"/> ZAS Palfijn |
|------------------|---|------------------------------------|--------------------------------------|
| Dagziekenhuis | 03 443 35 07 | 03 339 74 58 | 03 640 28 02 |
| Verpleegafdeling | 03 443 35 11 | 03 339 71 10 | |
| Centraal nummer | 03 443 30 11 | 03 217 71 11 | 03 640 21 11 |
| Spoed | 03 443 39 00 | 03 339 71 00 | 03 640 20 00 |