



Huidproblemen



Dr. Braeckmans Delphine
28^{ste} Herfstsymposium Pediatrie 2025

ZIEKENHUIS aan
de STROOM

Bijzonderheden skin of colour

Atopisch eczeem

Majorcriteria

Jeuk !

Typische locaties

Chronisch/chronisch
recidiverend verloop

Positieve atopie anamnese

Minorcriteria

Xerosis cutis

Pityriasis alba faciei

Keratosis pilaris

Dennie-Morgan plooitjes

Hertoghe teken

Perioculaire schaduwen

Dermographismus alba

Palmaire hyperlineariteit

Cheilitis

Mamilla eczeem


Verhoogd serum IgE

Type-I-sensibiliseringen

Recidiverende huidinfecties



Jongeren



Kind



Baby



Atopisch eczeem

Majorcriteria

Jeuk !

Typische locaties

Chronisch/chronisch
recidiverend verloop

Positieve atopie anamnese

Minorcriteria

Xerosis cutis

Pityriasis alba faciei

Keratosis pilaris

Dennie-Morgan plooitjes

Hertoghe teken

Perioculaire schaduwen

Dermographismus alba

Palmaire hyperlineariteit

Cheilitis

Mamilla eczeem

Verhoogd serum IgE

Type-I-sensibiliseringen

Recidiverende huidinfecties

Bijzonderheden skin of colour

- ✓ **Erytheem** is geen maatstaf voor de ernst van een atopisch eczeem bij SOC
- ✓ Onduidelijke diagnose? Denk aan **majorcriteria**: jeuk, typische leeftijdsgebonden locatie, chronisch (recidiverend) verloop, atopie anamnese + eventueel aanwezige **minorcriteria**
- ✓ Bespreek risico (tijdelijke) postinflammatorische **hyper- of hypopigmentatie**



Scabiës

Te behandelen: zowel personen met scabiësklachten als behandelgroep	Middel van eerste keus	Opmerkingen
Zuigeling < 4kg	Benzylbenzooat 25% lokaal tweemaal behandelen met 7 dagen ertussen	Ook hoofdhuid, gezicht, wenkbrauwen, nek en oren insmeren. Sokjes en wantjes aan. Geen slijmvliezen meesmeren. Na 24 uur herhalen en 24 uur daarna pas lichaam wassen.
Zuigeling/kinderen > 4 kg en t/m 12 jaar	Permetrine 5% lokaal tweemaal behandelen met 7 dagen ertussen óf ivermectine 200 µg/kg p.o. tweemaal behandelen met 7 dagen ertussen.	Bij permetrine: ook hoofdhuid, gezicht, wenkbrauwen, nek en oren insmeren. Sokjes en wantjes aan. Geen slijmvliezen meesmeren. Ivermectine: ook hoofdhuid, gezicht, wenkbrauwen, nek en oren insmeren. Sokjes en wantjes aan. Geen slijmvliezen meesmeren.
Kinderen > 12 jaar en volwassenen	Permetrine 5% lokaal tweemaal behandelen met 7 dagen ertussen óf Ivermectine 200 µg/kg p.o. tweemaal behandelen met 7 dagen ertussen.	Laat voorkeur van de persoon, eventuele (taal)barrièreproblemen bij voorlichting en verwachte compliance bij aanbrengen van lokale behandeling meewegen in therapiekeuze. Ivermectine: ook hoofdhuid, gezicht, wenkbrauwen, nek en oren insmeren. Sokjes en wantjes aan. Geen slijmvliezen meesmeren.

Behandeling van scabiës

Zwangeren	Permetrine 5% lokaal tweemaal behandelen met 7 dagen ertussen. Tweede keus: benzylbenzooat 25% tweemaal behandelen met 7 dagen ertussen.	Bij de mens onvoldoende gegevens over teratogene effecten, bij dierproeven geen nadelige effecten bij nakomelingen.
Bij borstvoeding	Permetrine 5% lokaal tweemaal behandelen met 7 dagen ertussen. Tweede keus: benzylbenzooat 25% tweemaal behandelen met 7 dagen ertussen. (Derde keus: ivermectine 200 µg/kg p.o. tweemaal behandelen met 7 dagen ertussen.)	Permetrine/benzylbenzooat: borsten insmeren, afkolven of voor de borstvoeding de borst schoonmaken, gedurende de behandelperiode: bij voorkeur 12 uur, minimaal 8 uur (permetrine) of 48 uur (benzylbenzooat). Bijsmeren tot de behandeltime verstreken is. Moedermelk hoeft niet weggegooid te worden. Ivermectine: minder dan 1% wordt uitgescheiden in de borstvoeding. Ervaring tijdens borstvoeding zeer beperkt beschreven, bij eenmalig gebruik weinig nadelige effecten te verwachten. Advies alleen bij kinderen ≤ 7 dagen oud een etmaal borstvoeding afkolven en weggooien.

Behandeling van scabiës

<https://www.departementzorg.be/nl/schurft-niet-schattig>

DEPARTEMENT ZORG

Behandelplan Benzybenzooat 25% voor symptomatische personen en nauwe contacten

Jouw arts heeft benzybenzooat lotion voorgeschreven voor de behandeling van schurft. In dit plan krijg je de nodige uitleg over de behandeling.

Als er schurft bij jou werd vastgesteld, dien je de behandeling 1 keer volledig uit te voeren.

Voorbereiding	- Zorg voor 2 sets proper beddengoed per huisgenoot - Zorg voor 2 sets proper kleding en handdoeken per huisgenoot
Behandeling op dag 1: -/-/-	Dag van de behandeling: - Was je kleren en beddengoed van de laatste 3 dagen op 60°. Gaat dit niet, dan 3 dagen in een afgesloten zak bewaren. - Alle stoffen spullen zoals knuffels, schoenen, jassen, hoofddeksels in een zak bewaren voor 3 dagen. - Neem geen douche of bad kort voor het aanbrengen van de zalf. - Smeer geen andere producten op de huid. - Knip de nagels van je vingers en tenen kort. Breng de lotion 's avonds aan: - Smeer de lotion vanaf de kaakrand tot en met voetzolen. - Smeer goed aan de huidplooien, onder de nagels en tussen vingers en tenen. - Laat iemand anders je rug insmeren met wegwerphandschoenen. - Geen lotion op het hoofd smeren behalve bij kinderen tussen 2 maanden en 2 jaar en ouderen. NIET rond ogen en mond! Doe kleine kinderen eventueel wanten aan. - Enkel smeren op de buitenkant van de geslachtsdelen. - Na het smeren propere kledij aantrekken en lakens vervangen. - Na wassen van handen of na toiletbezoek opnieuw lotion smeren onder nagels, handen en schaamstreek/bilplooien. - Laat de lotion minimum 24 uur intrekken.
Behandeling op dag 2: -/-/-	- Niet douchen! 's Avonds opnieuw insmeren met de lotion zoals voorgeschreven hierboven - Kleding en beddengoed niet ververset
Behandeling op dag 3: -/-/-	- Niet douchen! 's Avonds opnieuw insmeren met de lotion zoals voorgeschreven hierboven - Kleding en beddengoed niet ververset

Ochtend na dag 3	- Verwijder de lakens van het bed en was op 60° - Douch en droog af met een propere handdoek. - Trek proper kledij aan. - Was handdoeken en kledij van afgelopen nacht op 60° of steek in zakken voor 3 dagen (draag wegwerphandschoenen). - Leg propere lakens op het bed.
------------------	---

Het is belangrijk dat je ook gelijktijdig aanvullende hygiënische maatregelen neemt (zie bijlage)!

De jeuk kan na je behandeling nog tot 6 weken aanhouden. Dat is normaal. Indien nodig kan je aan je arts vragen om medicatie voor te schrijven tegen de jeuk. Indien je huid erg droog is, kan je een vochtinbrengende crème smeren.


DEPARTEMENT ZORG

Aanvullende hygiënische maatregelen bij het scabiës-behandelplan

Alle kleding (inclusief alle accessoires zoals mutsen en andere hoofddeksels, sjaals, handschoenen, sokken, ...) die de voorbije 3 dagen werden gedragen	Wassen op 60°C of 3 dagen in een afgesloten plastic zak op kamertemperatuur bewaren
Linnen (beddengoed, bedsprei, handdoeken, stoffen zakdoeken, ...) die de voorbije 3 dagen werden gebruikt	Wassen op 60°C of 3 dagen in een afgesloten plastic zak op kamertemperatuur bewaren
Matrassen	Stofzuigen en omdraaien
Kussens (bed, zetel, stoel, ...)	Wassen op 60°C of 3 dagen in een afgesloten plastic zak op kamertemperatuur bewaren
Tapijten	- Vast tapijt: stofzuigen en 3 dagen huidcontact vermijden - Losse tapijten: oprollen en 3 dagen laten luchten op kamertemperatuur (Vaste) trappenloper: stofzuigen en 3 dagen huidcontact vermijden
Materialen van baby's/kinderen	- Matras van bedje of park: stofzuigen en omdraaien - Relaxstoeltje: stofzuigen - Pluchen/stoffen knuffels: wassen op 60°C of 3 dagen in een afgesloten plastic zak
Zetels en stoelen met stof	- Stofzuigen - Bij recidief en/of uitgebreide letsels: zetel inpakken met plastic of 3 dagen laten luchten
Stoffen autozetel / Maxi-Cosi / kindervagen	In de zomer stofzuigen indien er met blote benen/schouders is opgezeten
Huisdieren	3 dagen geen fysiek contact - Dier niet in de zetel of het bed laten liggen



Behandeling van scabiës: contactpersonen



Behandeling van scabiës: uitdagingen

Permetrine resistentie?

Hoewel er enkele gevallen van resistentie tegen permetrine zijn geschreven in mijten die bij dieren voorkomen, is er geen definitief bewijs voor resistentie tegen medicamenteuze behandeling bij mensen.

Compliance smeersels?

Er is nauwelijks onderzoek gedaan naar de compliance van smeersels. Uit het onderzoek dat wel is gedaan, blijkt dat geen enkele persoon erin slaagt het gehele lichaam in te smeren!

Actieve scabiës infestatie of post-scabieus eczeem?

Dermatoscopisch geen onderscheid tussen levende en dode mijten mogelijk.

Review > [Dtsch Arztebl Int. 2021 Oct 15;118\(41\):695-704. doi: 10.3238/arztebl.m2021.0296.](#)

Scabies: Epidemiology, Diagnosis, and Treatment


Cord Sunderkötter ¹, Johannes Wohlrab, Henning Hamm

Observational Study > [J Dtsch Dermatol Ges. 2020 Jun;18\(6\):554-559. doi: 10.1111/ddg.14122.](#)
Epub 2020 May 29.

Application errors associated with topical treatment of scabies: an observational study

Romina Nemecek ¹, Anna Stockbauer ¹, Martina Lexa ², Wolfgang Poepl ¹, Gerhard Mooseder ¹





Tinea capitis



Dermatophyten


Zoöfiel

Microsporum canis
Trichophyton mentagrophytes
Trichophyton benhamiae
Trichophyton verrucosum
Trichophyton erinacei
Trichophyton equinum

Antropofiel

Trichophyton tonsurans
Trichophyton violaceum
Trichophyton soudanense
Trichophyton schoenleinii
Trichophyton rubrum








Take home message

- ✓ Eczeem ≠ altijd rood! Maak gebruik van andere criteria om de ernst van een eczeem op donkere huid in te schatten.
- ✓ Stijgende permetrine resistentie van scabiës-mijten? Benzylbenzoeaat als alternatieve therapie.
- ✓ Vergeet aangezicht en hoofdhuid niet te behandelen bij baby's.
- ✓ Tinea capitis **ALTIJD** systemisch behandelen! Vroegtijdige diagnose en behandeling voorkomen permanent haarverlies.

VRAGEN



ZAS Augustinus

- Oosterveldlaan 24, 2610 Wilrijk
Route 235 • (*maandag, woensdag, donderdag*)

ZAS Vincentius

- Sint-Vincentiusstraat 20, 2018 Antwerpen
Route 65 • (*dinsdag*)

03 285 28 50

delphine.braeckmans@zas.be