



DVD

Je arts heeft **DVD** voorgeschreven als onderdeel van je behandeling. Deze behandeling bestaat uit Velcade/bortezomib (SC spuit), daratumumab (SC spuit) en dexamethasone (capsules). We geven je in deze infofiche graag meer uitleg over de werking, het verloop en mogelijke bijwerkingen van je behandeling.

Hoe werkt mijn behandeling?



Doelgerichte therapie: Je krijgt een geneesmiddel toegediend dat **doelgericht op zoek gaat naar bepaalde eiwitten** in het lichaam.

Bortezomib is een **proteasoomremmer**. Het bindt zich in kankercellen aan een specifiek eiwit (het proteasoom) en blokkeert zo de werking van dit eiwit. Daardoor stapelen afvalstoffen op in de kankercel en zullen de cellen afsterven.

Daratumumab is specifiek gericht op **het CD38 eiwit** dat vaak voorkomt **op de plasmacellen**. Op deze manier kan het doelbewust de groei en verspreiding van dit type cellen tegengaan. De binding van daratumumab zorgt ervoor dat de plasmacellen gedood worden. Bovendien zal deze binding jouw eigen immuunsysteem ook aansporen om deze cellen aan te vallen en op te ruimen.





























Hoe verloopt mijn behandeling?

- De **behandelingen** worden toegediend in het **dagziekenhuis** van de dienst hematologie. De eerste toediening blijf je nog een korte periode ter observatie na het zetten van de spuiten. De exacte observatietijd wordt door de arts bepaald.
- Je afspraak verloopt als volgt:























- Je behandeling wordt toegediend in periodes, die **cycli** worden genoemd. De eerste acht cycli duren 21 dagen en bevatten 4 of 5 toedieningsmomenten per cyclus. Vanaf cyclus 9 zijn er 28 dagen per cyclus en dien je nog slecht één keer per cyclus naar het dagziekenhuis te komen. Het totaal aantal cycli wordt individueel bepaald door jouw arts.
- Op de volgende pagina geven we je een overzicht van je **behandelschema**. Dit is een standaardschema. De behandeltdijd en ondersteunende medicatie kan individueel wijzigen.


Cyclus 1-3

Geneesmiddel	Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6-7	Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13-14	Dag 15	Dag 16-21	Ter info
Litican 50mg															Voorkomen van misselijkheid Inname minstens 1 uur voor de therapie
Dafalgan 1g															Tegen koorts en rillen Inname minstens 1 uur voor de therapie
Cetirizine 10mg															Voorkomen van allergische reacties Inname minstens 1 uur voor de therapie
Dexamethasone 20mg															Voorkomen van allergische reacties Inname minstens 1 uur voor de therapie Cortisone vermindert ook het volume van de tumor
Bortezomib															Therapie Dit wordt als een subcutane inspuiting in de buik, een bovenarm of bovenbeen gegeven
Daratimumab															Therapie Dit wordt als een trage subcutane inspuiting in de buik gegeven

Cyclus 4-8

Geneesmiddel	Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6-7	Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13-21	Ter info
Litican 50mg													Voorkomen van misselijkheid Inname minstens 1 uur voor de therapie
Dafalgan 1g													Tegen koorts en rillen Inname minstens 1 uur voor de therapie
Cetirizine 10mg													Voorkomen van allergische reacties Inname minstens 1 uur voor de therapie
Dexamethasone 20mg													Voorkomen van allergische reacties Inname minstens 1 uur voor de therapie Cortisone vermindert ook het volume van de tumor
Bortezomib													Therapie Dit wordt als een subcutane inspuiting in de buik, een bovenarm of bovenbeen gegeven
Daratimumab													Therapie Dit wordt als een trage subcutane inspuiting in de buik gegeven

Cyclus 9-...

Geneesmiddel	Dag 1	Dag 2	Dag 3-28												Ter info
Dafalgan 1g															Tegen koorts en rillen Inname minstens 1 uur voor de therapie
Cetirizine 10mg															Voorkomen van allergische reacties Inname minstens 1 uur voor de therapie
Dexamethasone 20mg															Voorkomen van allergische reacties Inname minstens 1 uur voor de therapie Cortisone vermindert ook het volume van de tumor
Daratimumab															Therapie Dit wordt als een trage subcutane inspuiting in de buik gegeven

Wat zijn mogelijke bijwerkingen van mijn behandeling?

Elke behandeling kan bijwerkingen veroorzaken. De ernst van de bijwerkingen is **afhankelijk van de gebruikte producten** en kan **individueel** verschillen. Volgende bijwerkingen zijn specifiek voor je behandeling:

- Minder witte bloedcellen: verhoogd risico op infecties
- Minder rode bloedcellen: vermoeidheid
- Minder bloedplaatjes: risico op bloedingen
- Misselijkheid en braken
- Diarree of constipatie
- Daling van de bloeddruk en duizeligheid
- Huiduitslag en droge huid
- Hoofdpijn
- Tintelingen of voos gevoel in de vingers/tenen
- Irritatie van de ogen en/of wazig zicht
- Stemmingsstoornissen
- Overgevoelighedsreacties
- Pijn op de plaats van injectie

Aandachtspunten bij je behandeling:

- Het is belangrijk om te vermelden **welke andere geneesmiddelen** je neemt (ook als het gaat over voedingssupplementen, homeopathische middelen of vitaminen), want die kunnen mogelijk de werking van je behandeling beïnvloeden. Gelieve een overzicht van je thuismedicatie mee te nemen en te bespreken tijdens je volgende consultatie.
- We raden je aan om na je behandeling voldoende **water te drinken**.
- Tijdens de behandeling neem je ook **cortisone capsules** (dexamethasone). Cortisone is een belangrijk onderdeel van de behandeling, maar kan ook nevenwerkingen geven. Gekende nevenwerkingen zijn: onregelde bloedsuiker, verhoogde bloeddruk, opgejaagd gevoel, slapeloosheid, warmteopwellingen, vochtophoping en maaglast. Op de dagen van therapie neem je dit 30 minuten voor het starten van de therapie. De overige dagen neem je dit best 's ochtends, bij het ontbijt. Op deze manier volgen we het natuurlijk verloop van jouw eigen cortisolaanmaak in het lichaam en proberen we de nevenwerkingen tot het minimum te beperken.
- Meestal wordt er bij deze behandeling ook **co-medicatie** opgestart:

- Pantoprazole 20mg
- Aciclovir 800mg

- 1 x per dag 1 tablet (nuchter)
- 2 x per dag ½ tablet

- Maagbeschermer
- Preventie virale infectie (vb. zona)



Contacteer je behandelend team als een van de volgende problemen optreedt:

- Koorts van 38°C of hoger en/of koude rillingen
- Meer dan 24 uur hevig braken
- Meer dan 48 uur diarree
- Plots optredende en/of frequente bloedingen of blauwe plekken
- Ongewone hoofdpijn
- Extreme vermoeidheid of kortademigheid

Contactgegevens Hematologie

Hematologie	<input type="checkbox"/> ZAS Augustinus	<input type="checkbox"/> ZAS Cadix	<input type="checkbox"/> ZAS Middelheim
Dagziekenhuis	03 443 47 11	03 339 74 58	03 280 40 12
Verpleegafdeling	03 443 35 11	03 339 71 10	03 280 34 72
Centraal nummer	03 443 30 11	03 217 71 11	03 280 30 03
Spoed	03 443 39 00	03 339 71 00	03 280 40 52