



Cisplatine/paclitaxel

Hoe werkt mijn behandeling?



Chemotherapie: Je krijgt 2 geneesmiddelen, cisplatine en paclitaxel, toegediend die de celdeling afremmen en zo vooral sneldelende cellen, zoals **kankercellen**, beschadigen. Ze worden ook cytostatica of celremmende geneesmiddelen genoemd.

Hoe verloopt mijn behandeling?

- Je behandeling wordt toegediend op de verpleegafdeling van Oncologisch Centrum Antwerpen
- Je afspraak verloopt als volgt:



- Je behandeling wordt toegediend in periodes, die **cycli** worden genoemd. **1 cyclus duurt 21 dagen en omvat 1 opname van 1 of 2 overnachtingen.** Het totaal aantal cycli wordt bepaald door je arts.
- Hieronder geven we je een overzicht van je behandelingschema.

Cyclus van 21 dagen	Geneesmiddel	Dag -1	Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Ter info
	Dexamethason 8mg						<i>Tegen misselijkheid en allergische reacties</i> Inname van 1 capsule de avond vooraf (20u) + dag 2-3-4 's morgens bij ontbijt
	Spoeler						<i>Ter bescherming van de nieren</i>
	Akynzeo, cetirizine, dexamethason 12mg						<i>Tegen misselijkheid en allergische reacties</i> Inname min 1 uur voor start chemo
	Paclitaxel						Chemo Loopt 3 uur.
	Spoelvloeistof						10 minuten spoelen van leiding
	Cisplatine						Chemo Loopt 1 uur.
	spoeler						<i>Ter bescherming van de nieren</i> Loopt gedurende 1 uur

Dit is een standaardschema. De behandelingsduur en ondersteunde medicatie kan individueel wijzigen.

Wat zijn mogelijke bijwerkingen van mijn behandeling?

Elke behandeling kan bijwerkingen veroorzaken. De ernst van de bijwerkingen is afhankelijk van de gebruikte producten en kan individueel verschillen. Meer informatie over bijwerkingen en preventieve maatregelen vind je terug in de brochure 'Gids bij je kankerbehandeling met medicijnen'. Volgende bijwerkingen zijn specifiek voor je behandeling:

- Misselijkheid en braken
- Minder witte bloedcellen: verhoogd risico op infectie
- Minder rode bloedcellen: vermoeidheid
- Minder bloedplaatjes: risico op bloedingen
- Ontstoken mondslijmvlies en droge mond
- Diarree/Constipatie
- Werking nieren en blaas
- Vochttopstapeling (oedeem)
- Haarverlies
- Tintelingen of voos gevoel in vingers/tenen
- Nagelveranderingen
- Allergische- / overgevoelighedsreacties
- Oorsuizingen en een verminderd gehoor

Aandachtspunten bij je behandeling:

- Het is belangrijk om te vermelden **welke andere geneesmiddelen** je neemt (ook als het gaat over voedingssupplementen, homeopathische middelen of vitamines), want die kunnen mogelijk de werking van je behandeling beïnvloeden. Gelieve een overzicht van je thuismedicatie mee te nemen en te bespreken tijdens je volgende consultatie.
- Een **overgevoelighedsreactie** kan optreden tijdens het toedienen van Paclitaxel. Mogelijke symptomen zijn huiduitslag, roodheid van het gelaat, een gevoel van benauwdheid, snelle hartslag, lage bloeddruk, koorts of rillingen, lage rugpijn. Ter preventie wordt een voorbehandeling met dexamethasone en cetirizine voorzien. Merk je toch één van deze symptomen tijdens je behandeling? Waarschuw dan onmiddellijk je behandelend team.
- Cisplatine kan aanleiding geven tot verminderde nierwerking. Daarom wordt er voor het starten van de chemotherapie veel vocht toegediend om de nieren te beschermen. Soms kan hierdoor vochtophoping ontstaan. Dit wordt opgevolgd tijdens uw verblijf aan de hand van uw gewicht. Zo nodig worden vochtafdrijvende middelen toegediend.
- Paclitaxel: als dit geneesmiddel onbedoeld buiten het bloedvat terechtkomt (ook '**extravasatie**' genoemd), kan het weefselschade veroorzaken. Merk je pijn en/of een zichtbare zwelling op tijdens de toediening? Waarschuw dan onmiddellijk je behandelend team.



Contacteer je behandelend team als een van de volgende problemen optreedt:

- Koorts van 38° C of hoger of koude rillingen. Chemotherapie veroorzaakt een daling van de witte bloedcellen waardoor je vatbaarder en minder weerbaar bent tegen infecties. Bij koorts (temperatuur van 38° C of hoger) of koude rillingen is contact met het behandelteam aangewezen om een bloedname en nazicht in het ziekenhuis te organiseren.

Contactgegevens Oncologisch Centrum Antwerpen

Oncologisch centrum Antwerpen	<input type="checkbox"/> ZAS Augustinus	<input type="checkbox"/> ZAS Middelheim	<input type="checkbox"/> ZAS Palfijn
Dagziekenhuis	03 443 36 69	03 280 35 11	03 800 69 06
Verpleegafdeling	03 443 35 12	03 280 34 72	03 640 25 61
Consultatie	03 443 37 37		
Centraal nummer	03 443 30 11	03 280 31 11	03 640 21 11
Spoed	03 443 39 00	03 280 22 13	03 640 20 00