



Rituximab (Q28D – eerste 4 wekelijks IV)

Je arts heeft **rituximab** voorgeschreven als onderdeel van je behandeling. We geven je in deze infofiche graag meer uitleg over de werking, het verloop en mogelijke bijwerkingen van je behandeling.

Hoe werkt mijn behandeling?



Doelgerichte therapie: Je krijgt een geneesmiddel toegediend dat **doelgericht op zoek gaat naar bepaalde cellen** in het lichaam.

Rituximab is specifiek gericht **tegen het CD20 eiwit** dat aanwezig is **op de B-cellen**. Op deze manier kan het doelbewust de groei en verspreiding van dit type cellen tegengaan. De binding van rituximab zorgt ervoor dat de B-cellen gedood worden. Bovendien zal deze binding jouw eigen immuunsysteem ook aansporen om de B-cellen aan te vallen en op te ruimen.

Hoe verloopt mijn behandeling?

- Jouw **eerste behandeling** kan worden toegediend op de **verpleegafdeling** van de dienst hematologie. Je verblijft dan één nacht in het ziekenhuis ter observatie.
- De **volgende behandelingen** worden toegediend in het **dagziekenhuis** van de dienst hematologie.
- Je afspraak verloopt als volgt:



- Je behandeling wordt toegediend in periodes, die **cycli** worden genoemd. **Een cyclus duurt 28 dagen.** Tijdens de eerste cyclus zijn er vier wekelijkse toedieningen. Vanaf cyclus 2 is er slechts 1 toediening per cyclus. Het totaal aantal cycli wordt bepaald door je arts.
- Hieronder geven we je een overzicht van je **behandelschema**. Dit is een standaardschema. De behandel tijd en ondersteunende medicatie kan individueel wijzigen.

Cyclus 1	Geneesmiddel	Dag 1	Dag 8	Dag 15	Dag 22	Ter info
	Paracetamol 1g					Tegen koorts en rillen Inname minstens 1 uur voor de therapie
	Cetirizine 10mg					Voorkomen van allergische reacties Inname minstens 1 uur voor de therapie
	Methylprednisonolone 40mg					Voorkomen van allergische reacties Toediening minstens 1 uur voor de therapie
	Spoelvlloeistof					Traag inlopend waakinfuus
	Rituximab					Therapie Intraveneuze toediening volgens opklimschema
	Spoelvlloeistof					Naspoelen van de leidingen
Cyclus 2 - ...	Geneesmiddel	Dag 1	Dag 8	Dag 15	Dag 22	Ter info
	Paracetamol 1g					Tegen koorts en rillen Inname minstens 1 uur voor de therapie
	Cetirizine 10mg					Voorkomen van allergische reacties Inname minstens 1 uur voor de therapie
	Methylprednisonolone 32mg					Voorkomen van allergische reacties Inname minstens 1 uur voor de therapie
	Rituximab					Therapie Dit wordt vanaf de 2 ^e cyclus meestal als een trage subcutane inspuiting in de buik gegeven

Wat zijn mogelijke bijwerkingen van mijn behandeling?

Elke behandeling kan bijwerkingen veroorzaken. De ernst van de bijwerkingen is **afhankelijk van de gebruikte producten** en kan **individueel** verschillen. Volgende bijwerkingen zijn specifiek voor je behandeling:

- Overgevoeligheidsreacties
- Minder witte bloedcellen: verhoogd risico op infecties
- Verminderde opbrengst van antistoffen na vaccinaties

Aandachtspunten bij je behandeling:

- Het is belangrijk om te vermelden **welke andere geneesmiddelen** je neemt (ook als het gaat over voedingssupplementen, homeopathische middelen of vitaminen), want die kunnen mogelijk de werking van je behandeling beïnvloeden. Gelieve een overzicht van je thuismedicatie mee te nemen en te bespreken tijdens je volgende consultatie.
- We raden je aan om na je behandeling voldoende **water te drinken**.
- Een **overgevoeligheidsreactie** kan optreden tijdens het toedienen. Er wordt steeds medicatie voorzien (zie schema) ter preventie van deze reactie. Als bijkomende maatregel starten we de therapie bij de 1^e toediening aan een zeer lage inloopsnelheid. Daarna zal de snelheid om de 30 minuten verhoogd worden. Tijdens het inlopen worden jouw parameters ook continu gemonitord. Merk je zelf toch een reactie tijdens jouw behandeling? Waarschuw dan onmiddellijk je behandelend team.

Vanaf de 2^e toediening wordt dit aan een snellere inloopsnelheid gegeven en vanaf cyclus 2 wordt het meestal als een subcutane inspuiting gegeven.



Contacteer je behandelend team als een van de volgende problemen optreedt:

- Koorts van 38°C of hoger of koude rillingen

Contactgegevens Hematologie

Hematologie	<input type="checkbox"/> ZAS Augustinus	<input type="checkbox"/> ZAS Cadix	<input type="checkbox"/> ZAS Palfijn
Dagziekenhuis	03 443 35 07	03 339 74 58	03 640 28 02
Verpleegafdeling	03 443 35 11	03 339 71 10	
Centraal nummer	03 443 30 11	03 217 71 11	03 640 21 11
Spoed	03 443 39 00	03 339 71 00	03 640 20 00

ZAS vzw • Kempenstraat 100, 2030 Antwerpen • BE 0862.382.656 • RPR Antwerpen
Erkenningsnummer 7/10009/31/000: ZAS Cadix, ZAS Elisabeth, ZAS Erasmus, ZAS Hoge Beuken, ZAS Joostens, ZAS Middelheim, ZAS Palfijn, ZAS Paola, ZAS Polikliniek Regatta, ZAS UKJA • Erkenningsnummer 7/10099/38/000: ZAS Augustinus, ZAS Polikliniek Hof ter Schelde, ZAS Sint-Jozef, ZAS Vincentius • Erkenningsnummer 7/20998/03/000: ZAS PZ Stuivenberg • Erkenningsnummer 7/25047/28/000: ZAS PVT Antwerpen