



Fruquintinib

Je arts heeft **fruquintinib** voorgeschreven als onderdeel van je behandeling. We geven je in deze infofiche graag meer uitleg over de werking, het verloop en mogelijke bijwerkingen van je behandeling.

Hoe werkt mijn behandeling?



Doelgerichte therapie: Je krijgt een geneesmiddel toegediend dat **doelgericht op zoek gaat naar bepaalde eiwitten** in het lichaam.

Fruquintinib is specifiek gericht tegen **de VEGFR (Vasculaire Endotheliale Groeifactor Receptor)**. Door het blokkeren van deze VEGFR, kunnen er geen nieuwe bloedvaten gevormd worden binnen de kanker. Bijgevolg kunnen er ook geen extra voedingsstoffen of zuurstofmoleculen meer naar de kankercellen gevoerd worden. Dit zal de groei van kanker verstoren en vertragen.

Hoe verloopt mijn behandeling?

- De **behandeling** wordt toegediend op het **dagziekenhuis van het Oncologisch Centrum Antwerpen**.
- Je afspraak verloopt als volgt:



- Je behandeling wordt toegediend in periodes, die **cycli** worden genoemd. Een cyclus duurt **28 dagen**.
- Tijdens de **eerste 21 dagen van de cyclus** wordt er steeds één (of meerdere) capsule(s) **fruquintinib** ingenomen. Dit zijn capsules die je via het dagziekenhuis mee naar huis krijgt. De laatste 7 dagen van de cyclus wordt er een **rustweek** ingelast voor deze capsules. De dosis wordt individueel bepaald.

Fruquintinib	Week 1:	1	2	3	4	5	6	7
	Week 2:	8	9	10	11	12	13	14
	Week 3:	15	16	17	18	19	20	21
	Week 4:	22	23	24	25	26	27	28
		/	/	/	/	/	/	/

Wat zijn mogelijke bijwerkingen van mijn behandeling?

Elke behandeling kan bijwerkingen veroorzaken. De ernst van de bijwerkingen is **afhankelijk van de gebruikte producten** en kan **individueel** verschillen. Volgende bijwerkingen zijn specifiek voor je behandeling:

- Minder witte bloedcellen: verhoogd risico op infecties
- Minder bloedplaatjes: risico op bloedingen
- Vermoeidheid
- Diarree
- Verminderde eetlust
- Ontstoken mondslijmvlies
- Stemstoornissen
- Verhoging van de bloeddruk
- Hand-voetsyndroom
- Huiduitslag
- Skelet- en/of gewrichtspijn
- Verminderde werking van de schildklier

Aandachtspunten bij je behandeling:

- Het is belangrijk om te vermelden **welke andere geneesmiddelen** je neemt (ook als het gaat over voedingssupplementen, homeopathische middelen of vitaminen), want die kunnen mogelijk de werking van je behandeling beïnvloeden. Gelieve een overzicht van je thuismedicatie mee te nemen en te bespreken tijdens je volgende consultatie.
- We raden je aan om tijdens en na je behandeling voldoende **water te drinken**.
- Je neemt de pillen **fruquintinib** steeds op **hetzelfde tijdstip** van de dag. Dit kan zowel met als zonder voedsel ingenomen worden. Het is belangrijk dat er niet wordt gekauwd op de pillen. Daarnaast mag je ze ook niet openen of oplossen. Ben je een **dosis vergeten?** Dan mag je deze nog inhalen tot 12 uur na het gewoonlijke tijdstip. De dag nadien ga je verder op het gewoonlijke tijdstip.
- Bij deze medicatie zien we vaak dat er een verhoging van de bloeddruk optreedt. We vragen dan ook om jouw **bloeddruk thuis op te volgen**. Wanneer de bloeddruk te hoog wordt, is het mogelijk dat er bloeddrukverlagende medicatie wordt opgestart of dat de dosis van fruquintinib verlaagd wordt.



Contacteer je behandelend team als een van de volgende problemen optreedt:

- Koorts van 38°C of hoger en/of koude rillingen.
- Meer dan 24 uur hevig braken
- Meer dan 48 uur diarree
- Extreme vermoeidheid of kortademigheid
- Plots optredende en/of frequente bloedingen of blauwe plekken
- Pijnlijke mond of keel
- Ongewone hoofdpijn
- Hevige maagpijn

Contactgegevens Oncologisch Centrum Antwerpen

Oncologische centrum Antwerpen	☐ ZAS Augustinus	☐ ZAS Palfijn
Dagziekenhuis	03 443 35 07	03 640 28 02
Verpleegafdeling	03 432 60 00 (D1) 03 443 35 02 (D2)	03 640 25 61
Consultatie	03 443 37 37	03 640 28 13
Centraal nummer	03 443 30 11	03 640 21 11
Spoed	03 443 39 00	03 640 20 00