



Docetaxel-Cyclofosfamide

Je arts heeft **Docetaxel-Cyclofosfamide** voorgeschreven als onderdeel van je behandeling. We geven je in deze infofiche graag meer uitleg over de werking, het verloop en mogelijke bijwerkingen van je behandeling.

Hoe werkt mijn behandeling?



Chemotherapie: Je krijgt 2 geneesmiddelen, **docetaxel en cyclofosfamide**, toegediend die de **celdeling afremmen** en zo vooral snel delende cellen, zoals **kankercellen, beschadigen**. Deze geneesmiddelen worden ook cytostatica of celremmende geneesmiddelen genoemd

Hoe verloopt mijn behandeling?

- Je behandeling wordt toegediend in het **dagziekenhuis van het Oncologisch Centrum Antwerpen**
- Je afspraak verloopt als volgt:



- Je behandeling wordt toegediend in periodes, die **cycli** worden genoemd. **1 cyclus duurt 21 dagen met 1 toediening per cyclus**. Het totaal aantal cycli wordt bepaald door je arts.
- Hieronder geven we je een overzicht van je behandelingschema.

Cyclus van 21 dagen

Geneesmiddel	Dag -1	Dag 1	Dag 2	Dag 3-21	Ter info
Dexamethasone 8mg					Tegen allergische reacties. Inname van 1 capsule de avond voor de dag van toediening.
Spoelvloeistof					Voorspoeling
Dexamethasone 8mg					Tegen allergische reacties en misselijkheid en braken.
Palonosetron 250µg/5ml					Tegen misselijkheid en braken.
Cyclofosfamide					Chemo Loopt gedurende 15 minuten via infuus.
Spoelvloeistof					10 minuten spoelen van infuusleiding.
Docetaxel					Chemo Loopt gedurende 1 uur via infuus.
Spoelvloeistof					15 minuten spoelen van infuusleiding. Nadien verwijderen van infuus.
Dexamethasone 8mg					Tegen allergische reacties. Inname van 1 capsule 's morgens bij ontbijt op de dag na toediening.

Dit is een standaardschema. De behandel tijd en ondersteunde medicatie kan individueel wijzigen.

Wat zijn mogelijke bijwerkingen van mijn behandeling?

Elke behandeling kan bijwerkingen veroorzaken. De ernst van de bijwerkingen is afhankelijk van de gebruikte producten en kan individueel verschillen. Meer informatie over bijwerkingen en preventieve maatregelen vind je terug in de brochure 'Gids bij je kankerbehandeling met medicijnen'. Volgende bijwerkingen zijn specifiek voor je behandeling:

- Misselijkheid en braken
- Ongewone erge vermoeidheid
- Spierpijnen
- Minder witte bloedcellen: verhoogde vatbaarheid voor infecties
- Minder rode bloedcellen (bloedarmoede)
- Diarree en constipatie
- Ontstoken mondslijmvlies en droge mond
- Vocht op stapeling (oedeem)
- Haarverlies
- Tintelingen of voos gevoel in vingers/tenen
- Nagelveranderingen
- Allergische of overgevoeligheidsreacties
- Irritatie van slijmvlies van ogen (bv. tranende ogen) en neus (bv. korstvorming en soms bloedverlies bij snuiten)
- Klachten passend bij blaasontsteking
- Minder bloedplaatjes

Aandachtspunten bij je behandeling:

- Het is belangrijk om te vermelden **welke andere geneesmiddelen** je neemt (ook als het gaat over voedingssupplementen, homeopathische middelen of vitaminen), want die kunnen mogelijk de werking van je behandeling beïnvloeden. Gelieve een overzicht van je thuismedicatie mee te nemen en te bespreken tijdens je volgende consultatie.
- **Cyclofosfamide** kan klachten geven die lijken op een blaasontsteking. We raden je aan om na je behandeling voldoende water te drinken.
- Een **overgevoeligheidsreactie** kan optreden tijdens het toedienen van **Docetaxel**. Mogelijke symptomen zijn roodheid van het gelaat, gezwollen tong, sliklast, kort van adem, bloeddrukval, snelle hartslag, ... Ter preventie wordt een voor- en nabehandeling met dexamethasone voorzien. Je krijgt deze medicatie mee vanuit het ziekenhuis. Merk je toch één van deze symptomen tijdens of kort na je toediening? Waarschuw dan onmiddellijk je behandelend team.
- Bij gebruik van hand-voet-koeling, voornamelijk ter preventie van nagelafwijkingen, breng je best een paar (oude) handschoenen en sokken mee, waarvan de laatste vinger- en teenkootjes afgeknipt zijn.



Contacteer je behandelend team als een van de volgende problemen optreedt:

Koorts van 38°C of hoger of koude rillingen. Chemotherapie veroorzaakt een daling van de witte bloedcellen waardoor je vatbaarder en minder weerbaar bent tegen infecties. Bij koorts (temperatuur van 38°C of hoger) of koude rillingen is contact met het behandelteam aangewezen om een bloedname en nazicht in het ziekenhuis te organiseren.

Contactgegevens Oncologisch Centrum Antwerpen

Oncologisch centrum Antwerpen	☐ ZAS Augustinus	☐ ZAS Middelheim	☐ ZAS Palfijn
Dagziekenhuis	03 443 36 69	03 280 40 12	03 640 28 02
Verpleegafdeling	03 443 35 12	03 280 34 72	03 640 25 61
Consultatie	03 443 37 37	03 280 34 03	03 640 28 13
Centraal nummer	03 443 30 11	03 280 31 11	03 640 21 11
Spoed	03 443 39 00	03 280 22 13	03 640 20 00