

Wat je moet weten over een slokdarm- echocardiografie



Ziekenhuizen

GasthuisZusters Antwerpen

Sint-Augustinus - Sint-Vincentius - Sint-Jozef

Beste mevrouw, meneer

Welkom op de dienst cardiologie. In overleg met je behandelend arts onderga je straks een transoesofagale echografie (TEE) of slokdarmecho.

In deze brochure vind je algemene informatie over het verloop van het onderzoek. Als je na het lezen nog vragen hebt, aarzel dan niet om contact op te nemen met je behandelend arts of met het verpleegkundig personeel.

Ben je onverwacht verhinderd?

Gelieve ons uiterlijk 24 uur op voorhand te verwittigen via het nummer waarop je de afspraak gemaakt hebt. Indien wij niet op de hoogte zijn van je annulatie, zijn we genoodzaakt administratieve kosten aan te rekenen.

Doel van het onderzoek

Bij een transoesofagale echografie brengen we via de slokdarm een sonde in, met op het uiteinde een echokop. Omdat de slokdarm net achter het hart loopt, is het immers een zeer geschikt “echovenster” om het hart, de grote bloedvaten en de verschillende structuren te onderzoeken.

Sommige problemen kunnen we alleen maar op deze wijze detecteren.

Verloop van het onderzoek

Voor het onderzoek plaatsen we via een ader in je arm een infuus. Je ligt op je linkerzijde en laat je kin op je borst rusten zodat we de sonde gemakkelijk kunnen inbrengen. We verdoven de keel met een spray. Vaak dienen we een kortwerkend en licht kalmeermiddel toe.

Tijdens het onderzoek kan je normaal ademen door de neus en door de mond. Het inbrengen van de sonde is niet pijnlijk, maar geeft een kortstondig gevoel van misselijkheid dat door de verdoving van de keel en het kalmeermiddel goed wordt opgevangen.

Voorzorgsmaatregelen

Nuchter

Het is heel belangrijk om gedurende 6 uur voor het onderzoek nuchter te blijven (niet eten of drinken). Medicijnen mag je wel op het normale tijdstip innemen met een beetje water.

- Onderzoek 's morgens: nuchter vanaf middernacht.
- Onderzoek in de namiddag: licht ontbijt en daarna nuchter.

Antistolling

Indien je bloedverdunders neemt, moet je deze inname gewoon verderzetten. Bij de oudere bloedverdunders (zoals Marcoumar[®], Marevan[®] en Sintrom[®]) is het van belang dat de INR (= de mate van stolling) goed geregeld is. Neem de bloedwaarden van de laatste drie weken mee naar het onderzoek. Bij nieuwe bloedverdunders (Pradaxa[®], Xarelto[®], Lixiana[®], Eliquis[®]) is geen bloedcontrole vereist.

Eten en drinken na het onderzoek

Vermits je nuchter gebleven bent, heb je na het onderzoek waarschijnlijk honger. De eerste twee uur mag je echter niet eten en drinken omdat je keel nog verdoofd is. Hierdoor zou je je kunnen verslikken, waardoor er voedsel in je luchtwegen terecht komt, met bv. een luchtwegontsteking tot gevolg.

Autorijden

Aangezien je tijdens het onderzoek een kalmeermiddel krijgt, mag je niet autorijden en geen toestellen bedienen tot de volgende ochtend. Je zorgt dus best voor vervoer naar huis.

Sommige patiënten, vooral ouderen, zijn na het onderzoek door de verdoving wat onzeker te been. Wees dus voorzichtig! De verpleegkundige steekt waar nodig een handje toe. Als je dit wenst, kan je na het onderzoek nog even uitrusten in een bed.

Gebitsprothesen

Voor de start van het onderzoek vragen wij je om alle prothesen uit je mond te verwijderen. Zo voorkomen we dat deze tijdens het onderzoek loskomen en problemen veroorzaken (door bv. in de luchtwegen terecht te komen).

Slikstoornissen

Als je slikstoornissen hebt (bv. het voedsel dat niet vlot naar de maag gaat of terugkomt in de mond), een slokdarmletsel (bv. divertikel) of geopereerd bent aan de slokdarm of de keel, dan moet je dit zeker vermelden. Laat ons ook weten of je in het verleden bij een dergelijk onderzoek al problemen hebt ondervonden.

Allergie

Als je allergisch bent voor lokale verdovingsmiddelen (bv. xylocaine, lidocaine) vragen wij je om dit te melden. Allergieën voor latex en kalmeermiddelen zijn ook belangrijk.

Angst

Voel je je voor het onderzoek wat onzeker? Dat is helemaal niet ongewoon. Het is belangrijk dat je dit met ons bespreekt. Zo kunnen we je vragen en bezwaren zo goed mogelijk beantwoorden en opvangen.

Risico's

De slokdarmechocardiografie is een onderzoek met een laag risico.

Zoals bij elk onderzoek kunnen er zich steeds problemen of onverwachte verwickelingen voordoen. Een goede voorbereiding is dan ook essentieel om het onderzoek in optimale omstandigheden te laten verlopen.

Vermeld steeds andere gezondheidsproblemen (bv. longproblemen kunnen van belang zijn).

Cardioversie

Als dit onderzoek (TEE) gebeurt voor een cardioversie of "schokje", brengen we je naar de hartbewaking voor een korte opname.

Vragen

Als je na het lezen van deze folder nog vragen hebt, aarzel dan niet om contact op te nemen met je behandelend arts, de cardioloog die het onderzoek uitvoert of de verpleegkundige.

campus Sint-Augustinus
Oosterveldlaan 24
2610 Wilrijk
tel. + 32 3 443 30 11

campus Sint-Vincentius
Sint-Vincentiusstraat 20
2018 Antwerpen
tel. + 32 3 285 20 00

campus Sint-Jozef
Molenstraat 19
2640 Mortsels
tel. + 32 3 444 12 11

BTW BE 0428.651.017 - RPR Antwerpen
gzaziekenhuizen@gza.be
www.gzaziekenhuizen.be