



Starten met sulfazaline bij IBD
Salazopyrine®
Informatiebrochure voor patiënten





ZIEKENHUIS *aan*
de STROOM

Wat is sulfazaline?

01

Wat is het effect, doel en verloop van deze behandeling?

02

Mogelijke nevenwerkingen

03

Zwangerschap en borstvoeding

04

Wat is sulfazaline?

Medicatie met de werkzame stof sulfazaline wordt gebruikt om plaatselijk ontstekingen in de dunne en dikke darm te behandelen.

Het is een nog weinig gebruikt ouder geneesmiddel dat soms nog zijn nut heeft in geval van gewrichtsklachten geassocieerd aan IBD.

Het zijn tabletten die je tijdens de maaltijden moet innemen. De aangeraden dosis kan variëren van 4 tot 6 tabletten per dag. Je arts zal met je bespreken welke dosis voor jou optimaal is.

Wat is het effect, doel en verloop van deze behandeling?

02

Je klachten wegnemen is ons eerste doel.
Het effect van deze medicatie kan optreden na 6 tot 12 weken.

De opvolging gebeurt via regelmatige bloedafnames.
Die worden bij voorkeur om de 2 à 3 maanden afgenomen.

Mogelijke nevenwerkingen

Over het algemeen geeft deze medicatie weinig neveneffecten. Je urine kan een geeloranje kleur krijgen. De meest voorkomende neveneffecten zijn:

- misselijkheid
- maaglast
- hoesten
- gewrichtspijn
- koorts
- hoofdpijn

Bij een mogelijke zwangerschap of zwangerschaps-wens neem je contact op met je behandelend arts. Sulfazaline mag verder ingenomen worden als het noodzakelijk is. Als je de behandeling blijft voortzetten tijdens de zwangerschap, is het wel aan te raden om foliumzuursupplementen bij in te nemen.

Bij mannen kan een tijdelijke onvruchtbaarheid optreden tijdens de behandeling met salazopyrine. Deze is omkeerbaar en verdwijnt weer na 2 tot 3 maanden na stopzetting van deze medicatie.

Vraag ook naar de brochure IBD-centrum VIA waarin je alle contactgegevens terugvindt.

ZIEKENHUIS aan de STROOM



Ziekenhuis aan de Stroom
[ZAS] is het netwerk van
ZNA en GZA Ziekenhuizen

