

Mekinist® (trametinib)



Mekinist®, met trametinib als werkzame stof, wordt gebruikt voor de behandeling van een **melanoom** (een type huidkanker) dat uitgezaaid is naar andere delen van het lichaam of niet verwijderd kan worden via een operatie. Mekinist® wordt ook in combinatie met Tabinlar® (dabrafenib) gebruikt om een melanoom of **gevorderde niet-kleincellige longkanker (NSCLC)** te behandelen.



Mekinist® richt zich op specifieke eiwitten, de zogenaamde proteïne-kinasen, om zo de werking ervan te blokkeren. Een gevolg hiervan is dat de **kankercellen niet meer** in staat zijn om te **groeien** of om zich te **vermenigvuldigen** en daardoor **afsterven**.



Er bestaan 2 soorten Mekinist® tabletten: tabletten met 0,5 mg en 2 mg trametinib. De aanbevolen **dagelijkse dosis** is **2 mg**. Als de nevenwerkingen te zwaar doorwegen kan de arts in overleg met jou de dosis verminderen of kan de behandeling tijdelijk onderbroken worden.



Neem **eenmaal per dag op een vast tijdstip** de aanbevolen hoeveelheid Mekinist® in met een vol glas water.

Dagelijkse dosis: ... mg = ... tablet(ten) Mekinist® ... mg



Neem Mekinist® **ALTIJD ZONDER voedsel** in. Dit betekent dat je Mekinist® telkens **ten minste 1 uur vóór of 2 uur na het eten** moet innemen. Bij combinatietherapie trametinib steeds innemen op hetzelfde tijdstip bij ofwel de ochtend- ofwel de avonddosis van dabrafenib. Slik de tabletten **in hun geheel** door. Je mag de tabletten niet breken, fijnmalen of erop kauwen.



Als je een **dosis** Mekinist® bent **vergeten** en het duurt nog 12u of langer tot je de volgende dosis moet innemen, neem de tablet(ten) dan meteen in zodra je eraan denkt. Als het minder dan 4 uur duurt tot je je nieuwe dosis moet innemen, sla je de vergeten dosis over. Neem de volgende dosis in volgens het gebruikelijke schema. Neem **geen dubbele dosis** in om vergeten tabletten in te halen. Bij **braken na inname** de dosis niet herhalen, maar de volgende dosis innemen volgens het gebruikelijke schema.

Als je tijdens je behandeling met Mekinist® nog **andere medicatie, kruiden, homeopathische middelen of voedingssupplementen** inneemt of overweegt in te nemen, meld dit dan aan je arts of apotheker.



Mekinist® kan de samenstelling van je bloed verstoren en andere klachten veroorzaken. Daarom zal de arts regelmatig een bloedafname plannen om o.a. het aantal bloedcellen te controleren. De arts zal ook je bloeddruk, de werking van je hart en je gezichtsvermogen opvolgen.



- Als je je moe, zwak of duizelig voelt door de behandeling met Mekinist® of als je problemen hebt met je gezichtsvermogen, wees dan bijzonder **voorzichtig** wanneer je een **voertuig bestuurt** of een **machine gebruikt**.

Zoals elk geneesmiddel kan ook Mekinist® nevenwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. Volgende **nevenwerkingen** komen **zeer vaak** voor (bij meer dan 1/10 patiënten):



- ✓ Koorts ($\geq 38^{\circ}\text{C}$)
- ✓ Hoge bloeddruk
- ✓ Bloedingen (bloed ophoesten, bloed in de stoelgang)
- ✓ Hoofdpijn, duizeligheid
- ✓ Hoesten, kortademigheid
- ✓ Droge mond
- ✓ Misselijkheid en braken, buikpijn
- ✓ Diarree of moeilijke stoelgang (obstipatie)
- ✓ Huiduitslag (rash), droge of jeukende huid, acne-achtige bultjes
- ✓ Vermoeidheid
- ✓ Gezwollen handen en voeten (oedeem)
- ✓ Haaruitval (alopecia)
- ✓ Infectie van de bovenste luchtwegen
- ✓ Verminderde eetlust
- ✓ Gewrichtspijnen, spierpijn, pijn in de ledematen, spierspasmen
- ✓ Koude rillingen, algemene lichamszwakte
- ✓ Leverproblemen (gezien in bloedafname)

Contacteer het behandelend team:

- ✓ Als je veel last ondervindt van bovenvermelde nevenwerkingen
- ✓ Als je te veel van Mekinist® hebt ingenomen
- ✓ Als je hevige hoofdpijn hebt, duizelig bent, bloed ophoest of in de stoelgang vindt
- ✓ Bij ernstige huiduitslag, hartkloppingen of een onregelmatige hartslag, als je duizelig, moe, kortademig bent, spier- en/of gewrichtspijn, gezwollen enkels en benen hebt, blaren of zweren in de mond hebt, koorts of een oogontsteking hebt
- ✓ Als je oogproblemen ervaart (wazig zien, rode en gevoelige ogen, pijn in het oog, gevoelig zijn voor licht)
- ✓ Bij ernstige spierpijn, donkere urine
- ✓ In geval van long- en ademhalingsproblemen: kortademigheid, hoesten, droge keel, pijn op de borst en vermoeidheid
- ✓ Leverproblemen: verlies van eetlust, buikpijn, gele verkleuring van huid en oogwit, donkergekleurde urine, jeuk van de huid
- ✓ Bij hevige koorts ($\geq 38,5^{\circ}\text{C}$)



Noteer hier je vragen of specifieke bijwerkingen die je wil bespreken tijdens de volgende consultatie.

Contactgegevens ziekenhuis

