

Stivarga® (regorafenib)



Stivarga®, met regorafenib als werkzame stof, wordt gebruikt voor de behandeling van **dikke darm- of endeldarmkanker** met uitzaaiingen in andere lichaamsdelen, en bij **leverkanker**. Verder wordt Stivarga® opgestart bij **gastro-intestinale stromale tumoren (GIST)**, een soort kanker van de maag en darmen, die is uitgezaaid naar andere delen van het lichaam of niet geopereerd kan worden.



Stivarga® bindt in kankercellen aan specifieke eiwitten, de zogenaamde proteïnekinasen, om zo de werking ervan te blokkeren. Een gevolg hiervan is dat de **kankercellen niet meer** in staat zijn om te **groeien** of om zich te **vermenigvuldigen** en daardoor **afsterven**.



Elke tablet Stivarga® bevat 40 mg regorafenib. De aanbevolen **dagelijkse dosis** is **160 mg (4 tabletten)**. Als de nevenwerkingen te zwaar doorwegen kan de arts in overleg met jou de dosis verminderen of kan de behandeling tijdelijk onderbroken worden.



Neem de aanbevolen hoeveelheid in **op een vast tijdstip éénmaal per dag** met een half glas water. Stivarga® wordt toegediend volgens een **cyclus van 28 dagen**. Neem Stivarga® elke dag in gedurende 21 dagen. Na 21 dagen neem je gedurende 7 dagen **GEEN** Stivarga®-tabletten in (zie innameschema).

Dagelijkse dosis: ... mg = ... tablet(ten) Stivarga® 40 mg



Neem Stivarga® **ALTIJD NA een lichte, niet vette maaltijd** (minder dan 30% vet) in. Een voorbeeld van een lichte, vetarme maaltijd is: een toast met confituur, een portie ontbijtgranen, een glas magere melk, een glas appelsap en een kop koffie of thee (in het totaal 520 kcal, 2g vet). Slik de tabletten in hun geheel door met een half glas water. Kauw niet op de tabletten en maak ze niet fijn.



Als je een **dosis** bent **vergeten**, neem deze dan zo snel mogelijk in als je er op diezelfde dag aan denkt. Neem geen twee dosissen Stivarga® op dezelfde dag om de dosis van de dag ervoor in te halen.



Tijdens een behandeling met Stivarga® mag je geen **pompelmoes, sterfruit, granaatappel** of producten op basis van **Sint-Janskruid** gebruiken.

Als je tijdens je behandeling met Stivarga® nog **andere medicatie, kruiden, homeopathische middelen of voedingssupplementen** inneemt of overweegt in te nemen, meld dit dan aan je arts of apotheker.



Stivarga® kan de werking van je lever verstoren en andere klachten veroorzaken. Daarom zal de arts regelmatig een bloedafname plannen om o.a. de leverfunctie te controleren. Je arts zal ook je bloeddruk opvolgen.



- Als je tijdens de behandeling met Stivarga® symptomen ervaart die een invloed hebben op je concentratie- of reactievermogen, wees dan bijzonder **voorzichtig** als je een **voertuig bestuurt** of een **machine gebruikt**.

Zoals elk geneesmiddel kan ook Stivarga® nevenwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. Volgende **nevenwerkingen** komen **zeer vaak** voor (bij meer dan 1/10 patiënten):



- ✓ Verminderd aantal bloedplaatjes en rode bloedcellen
- ✓ Vermoeidheid, algemene lichaamszwakte
- ✓ Bloedneus, blauwe plekken
- ✓ Verminderde eetlust, gewichtsverlies
- ✓ Diarree
- ✓ Misselijkheid en braken
- ✓ Pijn en blaasjes of zweertjes in de mond (mondslijmvliesontsteking)
- ✓ Infecties: vaak van de urinewegen, neus, keel of longen
- ✓ Verhoogde bloeddruk
- ✓ Hand-voet huidreactie: roodheid en zwelling, eeltvorming, droge en schilferende huid, kloven en prikkelend, tintelend of brandend gevoel t.h.v. handpalmen en voetzolen
- ✓ Stemproblemen
- ✓ Huiduitslag (rash)

Contacteer het behandelend team:

- ✓ Als je veel last ondervindt van bovenvermelde nevenwerkingen
- ✓ Als je te veel van Stivarga® hebt ingenomen
- ✓ Bij gele verkleuring van de huid en het wit van de ogen, donkergekleurde urine, verwardheid en/of desoriëntatie
- ✓ Bij een bloeding: bloed in de ontlasting of donkergekleurde (zwarte) ontlasting, bloed in de urine, maagpijn, bloed ophoesten of bloed braken
- ✓ Bij ernstige maag- of darmproblemen: ernstige maagpijn of maagpijn die niet overgaat, bloed braken, rode of zwarte ontlasting
- ✓ Bij tekenen van infectie: hoge koorts, koude rillingen, ernstige hoest, kortademigheid, ernstige keelpijn, brandend gevoel of pijn bij het plassen, ongewone vaginale afscheiding of irritatie, roodheid, zwelling en/of pijn in een lichaamsdeel



Noteer hier je vragen of specifieke bijwerkingen die je wil bespreken tijdens de volgende consultatie.



Contactgegevens ziekenhuis



Innameschema Stivarga®

Cyclus 28 dagen		Stivarga® 40 mg																											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		