

Wat u moet weten over een leverpunctie

Dienst maag- en darmziekten
secretariaat: tel. + 32 3 443 36 57
verpleegafdeling: tel. + 32 3 443 35 13

campus Sint-Augustinus
Oosterveldlaan 24
2610 Wilrijk
tel. + 32 3 443 30 11

campus Sint-Vincentius
Sint-Vincentiusstraat 20
2018 Antwerpen
tel. + 32 3 285 2000

campus Sint-Jozef
Molenstraat 19
2640 Mortsels
tel. + 32 3 444 12 11

www.gzaziekenhuizen.be

Mijnheer, Mevrouw

Welkom op de dienst maag- en darmziekten. In overleg met uw behandelend arts ondergaat u straks een leverpunctie.

In deze brochure vindt u algemene informatie over het verloop en de voorbereiding ervan. Omdat er bij elk invasief onderzoek (waarbij we een instrument in een orgaan brengen) een kleine kans bestaat op complicaties, vragen we u deze informatie aandachtig te lezen. Zo krijgt u een beter inzicht in het onderzoek en kunt u ons ook verwittigen wanneer u denkt een risicopatiënt te zijn.

Als u na het lezen nog vragen hebt, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw behandelend arts of met het verpleegkundig personeel.

Bent u onverwacht verhinderd?

Gelieve ons uiterlijk 24 uur op voorhand te verwittigen via het nummer waar u de afspraak gemaakt hebt. Indien wij niet op de hoogte zijn van uw annulatie, zijn we genoodzaakt administratieve kosten aan te rekenen.

De voorbereiding

De dag van het onderzoek moet u nuchter blijven. Dit betekent dat u niet meer mag eten vanaf zes uur voor het onderzoek. We plaatsen een intraveneuze katheter om eventueel medicijnen toe te dienen. Verder is er geen specifieke voorbereiding noodzakelijk.

Het onderzoek

Eerst voeren we een echografie uit op de endoscopie-afdeling. Hierbij wordt de plaats van de biopsie (waar we in de lever prikken) opgezocht.

We verdoven lokaal de huid, zodat het onderzoek u niet te veel ongemakken bezorgt. Er wordt een kleine snede in de huid gemaakt, die achteraf heelt zonder litteken. Een prik met een dunne naald in de lever verloopt normaal pijnloos.

Na het onderzoek moet u gedurende een drietal uur op een zandzak op uw rechterzijde blijven liggen. Zo beperkt u het risico op bloeding uit de punctieplaats. Daarna is bedrust nodig (gedurende 24 uur). Dit betekent dat u ook om te eten in bed moet blijven.

De zijligging in het begin en de verplichte bedrust nadien zijn nodig om het risico op een bloeding zo laag mogelijk te houden. Het kan immers gebeuren dat door de punctie een bloedvat wordt geraakt. Door op uw zijde te gaan liggen, vermindert de kans dat dit blijft bloeden.

Complicaties

De kans is ongeveer 1 op 100 dat de bloeding niet stopt ondanks de zijligging. In de buik ontstaat dan een bloeding die meestal spontaan stopt, maar die wel pijn en ongemakken veroorzaakt in de bovenbuik. Dit gaat soms gepaard met wat pijn in de rechterschouder door de prikkeling van het middenrif.

Zeer zelden stopt de bloeding niet en is een chirurgische ingreep nodig om de bloeding te stelpen.

Aandachtspunten

- Blijf nuchter vóór het onderzoek. U mag niet meer eten vanaf zes uur vóór het onderzoek.
- Indien u stollingsproblemen hebt of Aspirine® of aspirinebevattende medicijnen neemt zoals: Perdolan®, Asaflow®, Dispril®, Acenterine®, of medicatie als Marcoumar®, Ticlid®, Marevan® of Sintrom®, brengt u ons hiervan op de hoogte.
- Meld eventuele allergieën of intolerantie voor medicijnen.
- Gelieve ons te melden of u bij de tandarts voor een behandeling antibiotica moet nemen.

Na het onderzoek

Omdat bedrust noodzakelijk is, blijft u minstens één nacht in het ziekenhuis.

Daarna, als u geen pijn meer hebt, mag u naar huis. Houd rekening met de volgende maatregelen:

- neem geen Aspirine® of aspirinebevattende medicijnen zoals Perdolan®, Asaflow®, Dispril®, Acenterine® en vermijd ook medicijnen als Marcoumar®, Ticlid®, Marevan® of Sintrom®, tenzij dit anders is afgesproken met uw arts;
- vermijd hefbewegingen gedurende vijf dagen;
- omwille van de snede die wij maken, vragen wij u om gedurende de eerste vier dagen geen bad te nemen. Douchen mag wel;
- maakt u zich ergens zorgen over of hebt u toenemende buikpijn, zwarte stoelgang of koorts, neem dan contact op met een arts.