

Zelboraf® (vemurafenib)



Zelboraf®, met vemurafenib als werkzame stof, wordt gebruikt voor de behandeling van een type huidkanker, **melanoom** genoemd, dat niet met een operatie kan verwijderd worden of zich verspreid heeft naar andere delen van het lichaam. Zelboraf® kan enkel gebruikt worden wanneer de kanker veroorzaakt wordt door een specifieke genetische verandering (mutaties in het BRAF-gen).



Zelboraf® bindt in kankercellen aan specifieke eiwitten, de zogenaamde proteïnekinasen, om zo de werking ervan te blokkeren. Een gevolg hiervan is dat de **kankercellen niet meer** in staat zijn om te **groeien** of om zich te **vermenigvuldigen** en daardoor **afsterven**.



Elke tablet Zelboraf® bevat 240 mg vemurafenib. De aanbevolen **dagelijkse dosis** is **960 mg (4 tabletten) tweemaal per dag**. Als de nevenwerkingen te zwaar doorwegen kan de arts in overleg met jou de dosis verminderen of kan de behandeling tijdelijk onderbroken worden.



Neem **tweemaal per dag, op een vast tijdstip** de aanbevolen hoeveelheid in met een half glas water. Zorg dat er ongeveer 12 uur zit tussen de twee innames.

Dagelijkse dosis: ... mg = ... tabletten Zelboraf® 240 mg per keer, tweemaal per dag



Zelboraf® **ALTIJD MET of ALTIJD ZONDER** voedsel innemen. Als je kiest voor inname zonder voedsel, vermijd dan consequente inname op een lege maag.

Slik de tabletten in hun geheel door met een half glas water. Je mag de tabletten niet breken, fijnmalen of erop kauwen.



Als je een **dosis** bent **vergeten** en het duurt nog 4 uur of langer tot je de volgende dosis moet innemen, neem de tabletten dan meteen in zodra je eraan denkt. Als het minder dan 4 uur duurt tot je je nieuwe dosis moet innemen, sla de vergeten dosis dan over. Ga vervolgens verder volgens het gebruikelijke schema. Neem **geen dubbele dosis** om de vergeten tabletten in te halen. Bij **braken na inname** de dosis niet herhalen, maar de volgende dosis innemen volgens het gebruikelijke schema.



Tijdens een behandeling met Zelboraf® mag je geen **pompelmoes, sterfruit, granaatappel** en producten op basis van **Sint-Janskruid** gebruiken.

Als je tijdens je behandeling met Zelboraf® nog **andere medicatie, kruiden, homeopathische middelen of voedingssupplementen** inneemt of overweegt in te nemen, meld dit dan aan je arts of apotheker.



Zelboraf® kan de werking van de lever en nieren verstoren en andere klachten veroorzaken. Daarom zal de arts regelmatig een bloedafname plannen om o.a. lever- en nierfunctie te controleren. Je arts zal ook je bloeddruk en hartslag opvolgen en je ogen en huid controleren.



- Als je je moe voelt of problemen met je zicht ervaart door de behandeling met Zelboraf®, wees dan bijzonder **voorzichtig** als je een **voertuig bestuurt** of een **machine gebruikt**.
- Vermijd langdurige blootstelling aan **zonlicht**. Draag beschermende kledij en een zonnebrandcrème en lippenbalsem met beschermingsfactor 30+.

Zoals elk geneesmiddel kan ook Zelboraf® nevenwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. Volgende **nevenwerkingen** komen **zeer vaak** voor (bij meer dan 1/10 patiënten):



- ✓ Verminderde eetlust, abnormale smaak in de mond
- ✓ Vochtophoping, voornamelijk in enkels, benen, armen (oedeem)
- ✓ Misselijkheid en braken
- ✓ Hoofdpijn, duizeligheid
- ✓ Diarree of moeilijke stoelgang
- ✓ Spier- en gewrichtspijn, rugpijn en pijn in benen en armen
- ✓ Vermoeidheid en algemene lichamszwakte
- ✓ Koorts ($\geq 38^{\circ}\text{C}$)
- ✓ Hoesten
- ✓ Huidproblemen (rash, jeuk, droge huid)
- ✓ Haarverlies (alopecia)

Contacteer het behandelend team :

- ✓ Als je veel last ondervindt van bovenvermelde nevenwerkingen
- ✓ Als je te veel van Zelboraf® hebt ingenomen
- ✓ Bij slik- of ademhalingsproblemen, zwelling van lippen, tong, gezicht of bij ernstige jeuk van de huid gepaard met rode huiduitslag
- ✓ Bij huiduitslag met één of meer van volgende symptomen: blaren op je huid, blaren of zweren in je mond, vervelling van je huid, koorts, roodheid of zwelling van je gezicht, handen of voetzolen
- ✓ Bij pijn, zwelling of roodheid aan het oog, wazig zien of andere zichtveranderingen
- ✓ Bij een ongewone verdikking van de handpalm samen met een verbuiging van de vingers naar binnen of een ongewone verdikking van de voetzool die pijnlijk kan zijn
- ✓ Als je veranderingen van je huid waarneemt



Noteer hier je vragen of specifieke bijwerkingen die je wil bespreken tijdens de volgende consultatie.



Contactgegevens ziekenhuis