



Epirubicine-Cyclofosfamide dose dense (EC DD)

Je arts heeft **Epirubicine-Cyclofosfamide (EC)** voorgeschreven als onderdeel van je behandeling. We geven je in deze infofiche graag meer uitleg over de werking, het verloop en mogelijke bijwerkingen van je behandeling.

Hoe werkt mijn behandeling?



Chemotherapie: Je krijgt 2 geneesmiddelen toegediend, **epirubicine en cyclofosfamide**, die de **celdeling afremmen** en zo vooral sneldelevende cellen, zoals **kankercellen, beschadigen**. Deze geneesmiddelen worden ook cytostatica of celremmende geneesmiddelen genoemd

Hoe verloopt mijn behandeling?

- Je behandeling wordt toegediend in het **dagziekenhuis van het Oncologisch Centrum Antwerpen**
- Je afspraak verloopt als volgt:



- Je behandeling wordt toegediend in periodes, die **cycli** worden genoemd. **1 cyclus duurt 14 dagen met 1 toediening per cyclus**. Het totaal aantal cycli wordt bepaald door je arts.
- Hieronder geven we je een overzicht van je behandelingschema.

Cyclus van 14 dagen	Geneesmiddel	Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5-14	Ter info
	Spoelvloeistof						Voorspoeling
	Dexamethasone 12mg						Tegen misselijkheid en braken. Inname 1 uur voor start chemo.
	Netupitant 300mg +palonosetron 0.5mg						Tegen misselijkheid en braken. Inname 1 uur voor start chemo.
	Epirubicine						Chemo Loopt gedurende 15 minuten via infuus.
	Spoelvloeistof						5 minuten spoelen van infuusleiding.
	Cyclofosfamide						Chemo Loopt gedurende 15 minuten via infuus.
	Spoelvloeistof						10 minuten spoelen van infuusleiding. Nadien verwijderen van infuus.
	Olanzapine 5mg						Tegen misselijkheid en braken. Inname 1x/dag 's avonds voor het slapen.
	Dexamethasone 4mg						Tegen misselijkheid en braken. Indien nodig 1x/dag 's morgens bij ontbijt.
	Lonquex 6mg						Stimulatie aanmaak witte bloedcellen. Onderhuidse inspuiting minstens 24u na beëindigen chemo (zelf toe te dienen of door thuisverpleegkundige).

Dit is een standaardschema. De behandel tijd en ondersteunde medicatie kan individueel wijzigen.

Wat zijn mogelijke bijwerkingen van mijn behandeling?

Elke behandeling kan bijwerkingen veroorzaken. De ernst van de bijwerkingen is afhankelijk van de gebruikte producten en kan individueel verschillen. Meer informatie over bijwerkingen en preventieve maatregelen vind je terug in de brochure 'Gids bij je kankerbehandeling met medicijnen'. Volgende bijwerkingen zijn specifiek voor je behandeling:

- Misselijkheid en braken
- Minder witte bloedcellen: verhoogde vatbaarheid voor infecties
- Minder rode bloedcellen (bloedarmoede)
- Haarverlies
- Diarree en constipatie
- Ontstoken mondslijmvlies en droge mond
- Ongewone vermoeidheid
- Minder bloedplaatjes

Aandachtspunten bij je behandeling:

- Het is belangrijk om te vermelden **welke andere geneesmiddelen** je neemt (ook als het gaat over voedingssupplementen, homeopathische middelen of vitaminen), want die kunnen mogelijk de werking van je behandeling beïnvloeden. Gelieve een overzicht van je thuismedicatie mee te nemen en te bespreken tijdens je volgende consultatie.
- **Cyclofosfamide** kan klachten geven die lijken op een blaasontsteking. We raden je aan om na je behandeling voldoende te drinken.
- **Epirubicine**: Als dit geneesmiddel onbedoeld buiten het bloedvat terecht komt (ook '**extravasatie**' genoemd), kan het weefselschade veroorzaken. Merk je pijn en/of een zichtbare zwelling op tijdens de toediening? Waarschuw dan onmiddellijk je behandelend team.
- **Epirubicine** kan een rode verkleuring van de urine geven. Dit is volkomen onschuldig en verdwijnt spontaan.
- Je krijgt de inspuiting **Lonquex** mee uit het ziekenhuis. Deze inspuiting wordt standaard toegediend op de dag na de (laatste) chemotoediening (minimum 24 uur en maximaal 72 uur nadien). Dit kan door een thuisverpleegkundige.



Contacteer je behandelend team als een van de volgende problemen optreedt:

Koorts van 38°C of hoger of koude rillingen. Chemotherapie veroorzaakt een daling van de witte bloedcellen waardoor je vatbaarder en minder weerbaar bent tegen infecties. Bij koorts (temperatuur van 38°C of hoger) of koude rillingen is contact met het behandelteam aangewezen om een bloedname en nazicht in het ziekenhuis te organiseren.

Contactgegevens Oncologisch Centrum Antwerpen

Oncologisch centrum Antwerpen	☐ ZAS Augustinus	☐ ZAS Middelheim	☐ ZAS Palfijn
Dagziekenhuis	03 443 36 69	03 280 40 12	03 640 28 02
Verpleegafdeling	03 443 35 12	03 280 34 72	03 640 25 61
Consultatie	03 443 37 37	03 280 34 03	03 640 28 13
Centraal nummer	03 443 30 11	03 280 31 11	03 640 21 11
Spoed	03 443 39 00	03 280 22 13	03 640 20 00

ZAS vzw • Kempenstraat 100, 2030 Antwerpen • BE 0862.382.656 • RPR Antwerpen
 Erkenningsnummer 7/10009/31/000: ZAS Cadix, ZAS Elisabeth, ZAS Erasmus, ZAS Hoge Beuken, ZAS Joostens, ZAS Middelheim, ZAS Palfijn, ZAS Paola, ZAS Polikliniek Regatta, ZAS UKJA • Erkenningsnummer 7/10099/38/000: ZAS Augustinus, ZAS Polikliniek Hof ter Schelde, ZAS Sint-Jozef, ZAS Vincentius • Erkenningsnummer 7/20998/03/000: ZAS PZ Stuivenberg • Erkenningsnummer 7/25047/28/000: ZAS PVT Antwerpen