

Lonsurf® (trifluridine)



Lonsurf®, met trifluridine en tipiracil als werkzame stoffen, wordt voorgeschreven voor de behandeling van volwassenen met **dikkedarmkanker of maagkanker**. Het wordt gebruikt wanneer de kanker is uitgezaaid naar andere delen van het lichaam en wanneer andere behandelingen niet zijn aangeslagen of niet geschikt zijn voor jou.



Trifluridine wordt in het lichaam omgezet tot specifieke metabolieten die de aanmaak van erfelijke informatie van de cel (DNA) verstoren. Een gevolg hiervan is dat de **kankercellen niet meer** in staat zijn om te **groeien** of om zich te **vermenigvuldigen**. Tipiracil zorgt ervoor dat trifluridine minder snel wordt afgebroken en versterkt zo de werking ervan.



Er bestaan 2 soorten Lonsurf® tabletten: tabletten die 15 mg trifluridine en 6,14 mg tipiracil bevatten en tabletten die 20 mg trifluridine en 8,19 mg tipiracil bevatten. De **dagelijkse dosis hangt af** van je **lichaamsoppervlakte** (berekend op basis van je lengte en lichaamsgewicht). Als de nevenwerkingen te zwaar doorwegen kan de arts in overleg met jou de dosis verlagen of kan de behandeling tijdelijk onderbroken worden.



Neem **tweemaal per dag** de aanbevolen hoeveelheid in met een glas water, **binnen het uur dat volgt op je ontbijt en je avondmaal**.

Lonsurf® wordt ingenomen volgens een **cyclus van 28 dagen**. Op dag 1 – 5 en dag 8 – 12 moet Lonsurf® worden ingenomen. Op de overige dagen neem je **GEEN** Lonsurf® in (zie innameschema).

Dagelijkse dosis: ... mg = ... tabletten Lonsurf® ... mg per keer, tweemaal per dag



Neem Lonsurf® **ALTIJD binnen het uur dat volgt op je ontbijt en je avondmaal** in.

Slik de tabletten **in hun geheel** door met een **glas water**. Je mag de tabletten **niet breken, niet fijnmalen** of erop **kauwen**.



Als je een **dosis bent vergeten**, neem dan de volgende dosis in volgens het gebruikelijke schema. Neem **geen dubbele dosis** om de vergeten tabletten in te halen.



Lonsurf® geeft onder andere een wisselwerking met geneesmiddelen die worden gebruikt voor de behandeling van HIV. Bespreek met je arts wat je moet doen als je dergelijk geneesmiddel neemt vooraleer je de behandeling met Lonsurf® start.

Als je tijdens je behandeling met Lonsurf® nog **andere medicatie, kruiden, homeopathische middelen of voedingssupplementen** inneemt of overweegt in te nemen, meld dit dan aan je arts of apotheker.



- Als je je ongewoon moe voelt door de behandeling met Lonsurf®, wees dan bijzonder **voorzichtig** wanneer je een **voertuig bestuurt** of een **machine gebruikt**.
- **Was** steeds de **handen** na contact met de tabletten.



Zoals elk geneesmiddel kan ook Lonsurf® nevenwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. Volgende **nevenwerkingen** komen **zeer vaak** voor (bij meer dan 1/10 patiënten):

- ✓ Verminderd aantal witte bloedcellen (leukopenie, neutropenie) met als gevolg een verhoogd risico op infecties
- ✓ Verminderd aantal bloedplaatjes (thrombocytopenie) met als gevolg een verhoogd risico op bloedingen
- ✓ Verminderd aantal rode bloedcellen (anemie) met als gevolg vermoeidheid
- ✓ Verminderde eetlust
- ✓ Diarree
- ✓ Misselijkheid en braken



Contacteer het behandelend team:

- ✓ Als je veel last ondervindt van bovenvermelde nevenwerkingen
- ✓ Als je te veel van Lonsurf® hebt ingenomen
- ✓ Bij tekenen van infectie: koorts ($\geq 38^{\circ}\text{C}$), zweten, koude rillingen, hoesten, ademhalingsproblemen of een piepende ademhaling, ...
- ✓ Bij kortademigheid, vermoeidheid, bleek zien
- ✓ Bij hevige pijn in maag of darmen, mogelijk met braken, (gedeeltelijk) verstopte darmen, koorts en opgezette buik
- ✓ Wanneer je last hebt van ongewone blauwe plekken of bloedingen
- ✓ Bij kortademigheid en pijn ter hoogte van de borst of de benen

Noteer hier je vragen of specifieke bijwerkingen die je wil bespreken tijdens de volgende consultatie.



Contactgegevens ziekenhuis



Innameschema Lonsurf®

Lonsurf® ... mg	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28