

Teysuno® (tegafur)



Teysuno® bevat de werkzame stoffen **tegafur, gimeracil en oteracil**. Het wordt voorgeschreven voor de behandeling van volwassenen met **gevorderde maagkanker**. Teysono wordt gebruikt in combinatie met cisplatine, een ander geneesmiddel tegen kanker dat via een intraveneus infuus wordt toegediend. Het wordt ook gebruikt als monotherapie of in combinatie met oxaliplatine of irinotecan, met of zonder bevacizumab voor de behandeling van **uitgezaaide darmkanker**.



Tegafur wordt in het lichaam omgezet tot een andere stof, 5-fluorouracil. Deze stof heeft een dubbele werking: het verhindert de aanmaak van DNA (de erfelijke informatie van de cel) en het beïnvloedt de aanmaak van eiwitten. Een gevolg hiervan is dat de **kankercellen niet meer** in staat zijn om te **groeien** of om zich te **vermenigvuldigen**. De werking van tegafur wordt versterkt door **gimeracil**. **Oteracil** zorgt ervoor dat je minder last hebt van de nevenwerkingen van tegafur.



Er bestaan 2 soorten Teysono® capsules: capsules met 15 mg tegafur, 4,35 mg gimeracil en 11,8 mg oteracil en capsules met 20 mg tegafur, 5,8 mg gimeracil en 15,8 mg oteracil. De **dagelijkse dosis hangt af** van je **lichaamsoppervlakte** (berekend op basis van je lengte en lichaamsgewicht). Als de nevenwerkingen te zwaar doorwegen kan de arts in overleg met jou de dosis verlagen of kan de behandeling tijdelijk onderbroken worden.



Neem **tweemaal per dag op een vast tijdstip**, 's morgens en 's avonds, de aanbevolen hoeveelheid in met een half glas water. Zorg dat er ongeveer 12 uur zit tussen de twee innames. Teysono® kan ingenomen worden (**kruis aan**):

- ☐ Per cyclus van **28 dagen**. Neem Teysuno® gedurende 21 dagen in, gevolgd door 7 dagen waarop je GEEN Teysuno® inneemt (zie innameschema)
- ☐ Per cyclus van **21 dagen**. Neem Teysuno® gedurende 14 dagen in, gevolgd door 7 dagen waarop je GEEN Teysuno® inneemt (zie innameschema)

Dagelijkse dosis: ... mg = ... capsules Teysuno® ... mg en
... capsules Teysuno® ... mg per keer, tweemaal per dag



Neem Teysuno® **ALTIJD ZONDER voedsel** in. Dit betekent dat je Teysuno® moet innemen **ten minste 1 uur vóór of 1 uur na de maaltijd**. Slik de capsules **in hun geheel** door met een half glas water. Je mag de capsules **niet openen, niet fijnmalen** of erop **kauwen**.



Als je een **dosis** bent **vergeten**, neem dan de volgende dosis in volgens het gebruikelijke schema. Neem **geen dubbele dosis** om de vergeten capsules in te halen. Bij **braken na inname** de dosis niet herhalen, maar de volgende dosis innemen volgens het gebruikelijke schema.



Teysuno® geeft onder andere een wisselwerking met foliumzuur, warfarine en fenytoïne. Bespreek met je arts wat je moet doen als je een van deze middelen neemt vooraleer je de behandeling met Teysuno® start.

Als je tijdens je behandeling met Teysuno® nog **andere medicatie, kruiden, homeopathische middelen of voedingssupplementen** inneemt of overweegt in te nemen, meld dit dan aan je arts of apotheker.



- Als je wazig ziet, je je ongewoon moe of duizelig voelt door de behandeling met Teysuno®, wees dan bijzonder **voorzichtig** wanneer je een **voertuig bestuurt** of een **machine gebruikt**.
- **Was** steeds je **handen** na contact met de capsules.

Zoals elk geneesmiddel kan ook Teysuno® nevenwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. Volgende **nevenwerkingen** komen **zeer vaak** voor (bij meer dan 1/10 patiënten):



- ✓ Verlies van eetlust
- ✓ Diarree of moeilijke stoelgang (obstipatie)
- ✓ Misselijkheid en braken
- ✓ Verminderd aantal rode bloedcellen met vermoeidheid, algemene lichaamszwakte (asthenie) als gevolg
- ✓ Verminderd aantal bloedplaatjes met bloedneus, blauwe plekken als gevolg
- ✓ Verminderd aantal witte bloedcellen met verhoogd risico op infecties als gevolg
- ✓ Tintelingen, pijn, vreemd gevoel ter hoogte van voeten en handen

Stop met het innemen van Teysuno® en **contacteer** het **behandelend team** :

- ✓ Als je veel last ondervindt van bovenvermelde nevenwerkingen
- ✓ Als je te veel van Teysuno®
- ✓ Als je vaker dan viermaal per dag, of 's nachts diarree hebt, of als je een pijnlijke mond en diarree hebt
- ✓ Als je meer dan tweemaal braakt in 24 uur
- ✓ Als je koorts ($\geq 38,5$ °C) hebt
- ✓ Bij bloedingen van de huid, mond (door het tandenpoetsen), neus, luchtwegen, maag of darmen

Contacteer het **behandelend team** :

- ✓ Als je vermoeid bent, koorts hebt en gebrek aan eetlust ervaart

Noteer hier je vragen of specifieke bijwerkingen die je wil bespreken tijdens de volgende consultatie.



Contactgegevens ziekenhuis





Innameschema Teysuno®

Cyclus 28 dagen																											
Teysono® ... mg																											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28

Cyclus 28 dagen																				
Teysono® ... mg																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21