

(Sutent® & generieken)



Sutent®, met sunitinib als werkzame stof, wordt gebruikt bij verschillende types kanker, zoals **uitgezaaide niercelkanker (mRCC)** en **maligne gastro-intestinale stromatumoren (GIST)**, wanneer Glivec® (imatinib), een ander antikankergeneesmiddel, niet meer werkt. Sutent® wordt ook gebruikt bij **neuro- endocriene tumoren** ter hoogte van de **pancreas** (pancreasNET) die uitgezaaid zijn of niet verwijderd kunnen worden met een operatie.



Sunitinib® bindt in kankercellen aan specifieke eiwitten, de zogenaamde proteïnekinasen, om zo de werking ervan te blokkeren. Een gevolg hiervan is dat de **kankercellen niet meer** in staat zijn om te **groeien** of om zich te **vermenigvuldigen** en daardoor **afsterven**.



Er bestaan 3 soorten capsules: capsules met 12,5 mg, 25 mg en 50 mg sunitinib. De aanbevolen **dagelijkse dosis** hangt af van het **type kanker**. Als je voor **GIST of mRCC** wordt behandeld, is de dagelijkse dosis **50 mg**. Als je voor **pancreasNET** wordt behandeld, is de dagelijkse dosis **37,5 mg**. Als de nevenwerkingen te zwaar doorwegen kan de arts in overleg met jou de dosis verminderen of kan de behandeling tijdelijk onderbroken worden.



Neem **éénmaal per dag op een vast tijdstip** de aanbevolen dosis met een glas water (kruis aan):

- ☐ Voor **GIST of mRCC** neem je Sutent® telkens in volgens een cyclus van 3 of 6 weken.
 - ☐ **6 weken:** Je neemt per cyclus sunitinib **gedurende 4 weken**, gevolgd door **2 weken** waarin **GEEN** sunitinib wordt ingenomen.
 - ☐ **3 weken:** je neemt sunitinib **gedurende 2 weken**, gevolgd door **1 week waarin GEEN sunitinib** genomen wordt.
- ☐ Voor **pancreasNET** neem je Sutent® **elke dag** in zonder pauze.

Dagelijkse dosis: ... mg = ... capsules Sutent® ... mg



Neem Sutent® **ALTIJD MET** of **ALTIJD ZONDER voedsel** in. Als je kiest voor een inname zonder voedsel, doe je dit telkens ten minste 1 uur vóór het eten of 2 uur na het eten. Je mag de capsules **niet openen, fijnmalen** of erop **kauwen**.



Als je een **dosis** bent **vergeten**, neem dan de volgende dosis in volgens het gebruikelijke schema. Neem **geen dubbele dosis** om de vergeten capsule(s) in te halen.



Tijdens een behandeling met Sutent® mag je geen **pompelmoes, sterfruit, granaatappel** en producten op basis van **Sint-Janskruid** gebruiken.

Als je tijdens je behandeling met Sutent® nog **andere medicatie, kruiden, homeopathische middelen of voedingssupplementen** inneemt of overweegt in te nemen, meld dit dan aan je arts of apotheker.



Sunitinib kan de samenstelling van je bloed verstoren en andere klachten veroorzaken. Daarom zal de arts regelmatig een bloedafname plannen om o.a. het aantal bloedcellen te controleren. De arts zal ook je bloeddruk opvolgen.



- Als je je duizelig of ongewoon moe voelt door de behandeling met sunitinib, wees dan bijzonder voorzichtig wanneer je een voertuig bestuurt of een machine gebruikt.

Zoals elk geneesmiddel kan ook sunitinib nevenwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. Volgende **nevenwerkingen** komen **zeer vaak** voor (bij meer dan 1/10 patiënten):

- | | |
|---|--|
| ✓ Vermoeidheid, krachtsverlies | ✓ Vochtophoping in de benen of voeten en rond de ogen (oedeem) |
| ✓ Verhoogde bloeddruk | ✓ Roodheid, droge huid, blaren op handpalmen en voetzolen |
| ✓ Gedaald aantal rode bloedcellen, bloedplaatjes en witte bloedcellen | ✓ Geelverkleuring van de huid of haarverkleuring |
| ✓ Hoofdpijn, duizeligheid | ✓ Slapeloosheid |
| ✓ Kortademigheid | ✓ Pijn in armen en benen, gewrichtspijn en rugpijn |
| ✓ Hoesten | ✓ Koorts ($\geq 38^{\circ}\text{C}$) |
| ✓ Misselijkheid, braken, buikpijn | ✓ Bloedneus |
| ✓ Diarree of moeilijke stoelgang (obstipatie) | ✓ Verminderde werking schildklier (hypothyreoïdie) |
| ✓ Verminderde eetlust, smaakstoornissen | |
| ✓ Mondslimvliesontsteking (pijn en blaasjes of zweertjes in de mond) | |



Contacteer het behandelend team:

- ✓ Als je veel last ondervindt van bovenvermelde nevenwerkingen
- ✓ Als je te veel van sunitinib hebt ingenomen
- ✓ Bij kortademigheid, gezwollen voeten en enkels, erge vermoeidheid
- ✓ Als je ademhalingsproblemen ervaart, zoals veel hoesten, pijn op de borst en ophoesten van bloed
- ✓ Bij ernstige buikklachten (gezwollen en pijnlijk), koorts, misselijkheid, braken van bloed, bloed vermengd met de ontlasting (donkere ontlasting)
- ✓ Als je minder of niet meer urineert



Noteer hier je vragen of specifieke bijwerkingen die je wil bespreken tijdens de volgende consultatie.



Contactgegevens ziekenhuis

