

Everolimus (Afinitor®)



Afinitor®, met everolimus als werkzame stof, wordt gebruikt bij verschillende types kanker zoals **gevorderde nierkanker** en **neuro-endocriene tumoren** ter hoogte van de **longen, pancreas of het maag-darmstelsel**. Verder kan Afinitor® opgestart worden bij **hormoongevoelige borstkankers** in combinatie met een hormoonremmer.



Everolimus bindt in kankercellen aan een specifiek eiwit, het zogenaamde mTOR-eiwit, om zo de werking ervan te blokkeren. Een gevolg hiervan is dat de **kankercellen niet meer** in staat zijn om te **groeien** of om zich te **vermenigvuldigen**.



Er bestaan 3 soorten Afinitor® tabletten: tabletten met 2,5 mg, 5 mg en 10 mg everolimus. Meestal wordt gestart met een **dagelijkse dosis** van **10 mg**. Als de nevenwerkingen te zwaar doorwegen kan de arts in overleg met jou de dosis verminderen naar 5 mg/dag of kan de behandeling tijdelijk onderbroken worden.



Neem **éénmaal per dag op een vast tijdstip** de aanbevolen dosis in met een glas water.

Dagelijkse dosis: ... mg = ... tablet(ten) Afinitor®



Neem Afinitor® **met of zonder voedsel** in. Slik de tablet(ten) **in hun geheel** door met een **glas water**. Je mag de tablet(ten) **niet breken, niet fijnmalen of erop kauwen**.



Als je een **dosis** bent **vergeten**, neem dan de volgende dosis in volgens het gebruikelijke schema. Neem **geen dubbele dosis** om de vergeten tablet(ten) in te halen.

Bij **braken na inname** de dosis niet herhalen, maar de volgende dosis innemen volgens het gebruikelijke schema.



Tijdens een behandeling met Afinitor® mag je **geen pompelmoes, sterfruit, granaatappel** of producten op basis van **Sint-Janskruid** gebruiken.

Als je tijdens je behandeling met Afinitor® nog **andere medicatie, kruiden, homeopathische middelen of voedingssupplementen** inneemt of overweegt in te nemen, meld dit dan aan je arts of apotheker.



Neem steeds contact op met je arts wanneer je een **vaccinatie** overweegt. Sommige vaccins geven immers een verhoogde kans op infecties, omdat het immuunsysteem verzwakt is door ziekte en/of behandeling.



- Als je last krijgt van vermoeidheid door de behandeling met Afinitor®, wees dan bijzonder **voorzichtig** wanneer je een **voertuig bestuurt** of een **machine gebruikt**.
- Afinitor® bevat **lactose**, indien je bepaalde suikers niet verdraagt, meld dit dan aan je arts of apotheker voordat je dit geneesmiddel inneemt.
- **Vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding**: speciale voorzorgen zijn nodig, spreek erover met uw arts of apotheker.

Zoals elk geneesmiddel kan ook Afinitor® nevenwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. Volgende **nevenwerkingen** komen **zeer vaak** voor (bij meer dan 1/10 van de patiënten)



- | | |
|---|---|
| ✓ Mondslijmvliesontsteking (pijn en blaasjes of zweertjes in de mond) | ✓ Longontsteking, maar niet veroorzaakt door infectie (pijnlijke hoestbuien, fluimen, koorts, kortademigheid, pijn bij diep inademen) |
| ✓ Misselijkheid, braken | ✓ Verminderde eetlust, abnormale smaak in de mond |
| ✓ Diarree | ✓ Gewichtsverlies |
| ✓ Huiduitslag (rash), jeuk | ✓ Vochtophoping, voornamelijk in enkels, benen, armen (oedeem) |
| ✓ Verminderd aantal rode bloedcellen (anemie) | ✓ Bloedneus, hoesten |
| ✓ Vermoeidheid, algemene lichamszwakte | ✓ Hoofdpijn |
| ✓ Infecties: vaak van de urinewegen of longen | ✓ Verhoogde bloedsuiker en cholesterol |



Contacteer het behandelend team:

- ✓ Als je veel last ondervindt van bovenvermelde nevenwerkingen
- ✓ Als je te veel Afinitor® hebt ingenomen
- ✓ Bij slik- of ademhalingsproblemen, zwelling van lippen, tong, gezicht of bij ernstige jeuk van de huid gepaard met rode huiduitslag
- ✓ Bij tekenen van infectie: koorts ($\geq 38^{\circ}\text{C}$), koude rillingen, hoesten, ademhalingsproblemen of een piepende ademhaling, ...
- ✓ Bij jeukende of pijnlijke huid met rode vlekken
- ✓ Bij ernstig of aanhoudend braken of diarree

Noteer hier je vragen of specifieke bijwerkingen die je wil bespreken tijdens de volgende consultatie.



Contactgegevens ziekenhuis

