



Infofiche cisplatine-etoposide-bleomycine (BEP)

Je arts heeft **cisplatine-etoposide-bleomycine** voorgeschreven als onderdeel van je behandeling. We geven je in deze infofiche graag meer uitleg over de werking, het verloop en mogelijke bijwerkingen van je behandeling.

Hoe werkt mijn behandeling?



Chemotherapie: Je krijgt 3 geneesmiddelen toegediend die de **celdeling afremmen** en zo vooral snedelende cellen, zoals **kankercellen, beschadigen**. Deze geneesmiddelen worden ook cytostatica of celremmende geneesmiddelen genoemd

Hoe verloopt mijn behandeling?

- Je behandeling wordt toegediend **op de verpleegafdeling van het Oncologisch Centrum Antwerpen en in het dagziekenhuis**.
- Je afspraak verloopt als volgt:



- Je behandeling wordt toegediend in periodes, die **cycli** worden genoemd. **1 cyclus duurt 21 dagen en omvat 1 opname van 7 dagen op de verpleegafdeling en 2 dagopnames (dag 8 en dag 15) in het dagziekenhuis zonder overnachting**. Het totaal aantal cycli wordt bepaald door je arts.
- Hieronder geven we je een overzicht van je behandelingschema.

Cyclus van 21 dagen

Geneesmiddel	Dag -1	Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 8	Dag 15	Ter info
Akynzeo, Dexamethasone 12mg										Tegen allergische reacties en misselijkheid Inname minstens 1 uur voor start van chemo
Dexamethasone 8mg										Tegen allergische reacties en misselijkheid Bij ontbijt
Spoeler										Bescherming van de nieren
Cisplatine										Chemo Loopt gedurende 1 uur
Spoeling										10 minuten spoelen van leiding
Etoposide										Chemo Loopt gedurende 1 uur
Spoelvloeistof										10 minuten spoelen van leiding
Bleomycine										Chemo Loopt gedurende 1 uur
Spoelvloeistof										10 minuten spoelen van leiding + verwijderen van leiding

Dit is een standaardschema. De behandeltdijd en ondersteunde medicatie kan individueel wijzigen.

Wat zijn mogelijke bijwerkingen van mijn behandeling?

Elke behandeling kan bijwerkingen veroorzaken. De ernst van de bijwerkingen is afhankelijk van de gebruikte producten en kan individueel verschillen. Meer informatie over bijwerkingen en preventieve maatregelen vind je terug in de brochure 'Gids bij je kankerbehandeling met medicijnen'. Volgende bijwerkingen zijn specifiek voor je behandeling:

- Misselijkheid en braken
- Minder witte bloedcellen: verhoogd risico op infectie
- Minder rode bloedcellen: vermoeidheid
- Minder bloedplaatjes: risico op bloedingen
- Misselijkheid en braken
- Smaak- en reukveranderingen
- Ontstoken mondslijmvlies en droge mond
- Diarree en constipatie
- Werking nieren en blaas
- Haarverlies
- Huidveranderingen
- Tintelingen of voos gevoel in vingers/tenen
- Oorsuizingen en een verminderd gehoor
- Koorts tot 24 u na bleomycine
- Prikkelhoest
- Gewichtstoename

Aandachtspunten bij je behandeling:

- Het is belangrijk om te vermelden **welke andere geneesmiddelen** je neemt (ook als het gaat over voedingssupplementen, homeopathische middelen of vitaminen), want die kunnen mogelijk de werking van je behandeling beïnvloeden. Gelieve een overzicht van je thuismedicatie mee te nemen en te bespreken tijdens je volgende consultatie.
- Cisplatine kan aanleiding geven tot **verminderde nierwerking**. Daarom wordt er voor het starten van de chemotherapie veel vocht toegediend om de nieren te beschermen. Soms kan hierdoor vochtophoping ontstaan. Dit wordt opgevolgd tijdens uw verblijf aan de hand van uw gewicht. Zo nodig worden vochtafdrijvende middelen toegediend.
- Bleomycine kan schadelijk zijn voor je **longen**. Je arts zal mogelijk een longfunctieonderzoek laten uitvoeren. Bespreek ook met je arts als je sporten beoefent zoals diepzeeduiken of bergbeklimmen.
Wanneer u in de toekomst een ingreep of onderzoek moet ondergaan, is het belangrijk om te vermelden dat u in het verleden Bleomycine® gekregen hebt. Een arts of anesthesist moet dit weten in functie van de toediening van eventuele zuurstof.
- Als het geneesmiddel cisplatine onbedoeld buiten het bloedvat terecht komt (ook 'extravasatie' genoemd), kan het weefselschade veroorzaken. Merk je pijn en/of een zichtbare zwelling op tijdens de toediening? Waarschuw dan onmiddellijk je behandelend team.



Contacteer je behandelend team als een van de volgende problemen optreedt:

Koorts boven 38°C of bij rillingen. Chemotherapie veroorzaakt een daling van de witte bloedcellen waardoor je vatbaarder en minder weerbaar bent tegen infecties. Bij koorts (temperatuur van 38°C of hoger) of koude rillingen is contact met het behandelteam aangewezen om een bloedname en nazicht in het ziekenhuis te organiseren.

Contactgegevens Oncologisch Centrum Antwerpen

Oncologisch centrum Antwerpen	<input type="checkbox"/> ZAS Augustinus	<input type="checkbox"/> ZAS Middelheim	<input type="checkbox"/> ZAS Palfijn
Dagziekenhuis	03 443 36 69	03 280 35 11	03 800 69 06
Verpleegafdeling	03 443 35 12	03 280 34 72	03 640 25 61
Consultatie	03 443 37 37		
Centraal nummer	03 443 30 11	03 280 31 11	03 640 21 11
Spoed	03 443 39 00	03 280 22 13	03 640 20 00