

# Circumcisie

Informatie voor patiënten





Je hebt samen met je uroloog beslist om een ingreep te laten doen. Tijdens de raadpleging wordt de datum van de ingreep en de dag van je opname vastgelegd. Als dat mogelijk is, word je de dag van de ingreep opgenomen. Soms is het noodzakelijk om de dag voor de ingreep opgenomen te worden. Door je uroloog wordt een opnameformulier ingevuld waarmee je je daarna aan de raadpleging meldt bij de afdeling 'zorgtrajectplanning'. Van hieruit zal de coördinatie van je opname gebeuren: reservering van de kamer (één-of-meerpersoonskamer) en indien nodig afspraken voor onderzoeken voor de operatie en aanvullend een raadpleging bij anesthesie. Er zal voor gezorgd worden dat bijkomende instructies van je behandelend uroloog uitgevoerd worden (bijvoorbeeld stoppen van bloedverduunners).

Via deze brochure hopen wij je wegwijs te maken in het verloop van je operatie en je verblijf in het ziekenhuis.

Deze brochure geeft je algemene informatie en ook extra informatie naast het gesprek met je uroloog. Bijzondere omstandigheden kunnen ervoor zorgen dat we onze aanpak wat moeten veranderen. Als dat het geval is, zal de uroloog je dit zeker laten weten.

## Inleiding

Een circumcisie of besnijdenis is het met een operatie verwijderen van een gedeelte of de hele voorhuid van de penis.

## Belangrijk voor de opname

Het is zeer belangrijk om bij je bezoek aan je uroloog altijd te vermelden of je al dan niet behandeld wordt met bloedverdünnende medicijnen. Enkele voorbeelden hiervan zijn Aggrenox, Plavix, Ticlid, Sintrom, Marcoumar, Marevan, Xarelto, Eliquis... Omdat deze producten de bloedstolling beïnvloeden, betekenen zij een groot bloedinggevaar tijdens en na de operatie. De arts zal met je bespreken om de inname van deze medicijnen een periode voor de operatie te stoppen. Asaflow mag bij de meeste ingrepen gewoon doorgenomen worden. Dit bespreekt je uroloog met je.

Het is ook van belang mogelijke allergieën mee te delen zodat de nodige preventieve maatregelen genomen kunnen worden. Voorbeelden zijn latexallergie, contrastallergie, allergie voor bepaalde medicijnen of producten, ...

## De opname

Een circumcisie gebeurt in dagkliniek. Je mag dus dezelfde dag naar huis.

Vooraleer de operatie kan plaatsvinden, moet je voorbereid worden:

- Je moet nuchter blijven vanaf 0.00 u. Nuchter zijn betekent niet eten, niet drinken en niet roken.
- De verpleegkundige die voor jou verantwoordelijk is, zal je vertellen hoe laat je geopereerd wordt.
- Vlak voor het vertrek naar de operatiekamer zal je gevraagd worden juwelen, piercings, lenzen, tandprothese te verwijderen en een operatieschortje aan te trekken.

### Verloop van de ingreep

De narcose kan volledig of gedeeltelijk zijn. De beslissing gebeurt in overleg met de anesthesist. Bij volledige verdoving word je volledig in slaap gedaan. Bij gedeeltelijke verdoving (rachiverdoving) krijg je een ruggenprik en zal na inspuiten van de medicatie je onderlichaam gevoelloos worden.

De verklevingen tussen de voorhuid en de eikel worden losgemaakt. De voorhuid wordt volledig of gedeeltelijk verwijderd (dit werd van tevoren samen met je arts beslist) en aan de basis van de eikel worden rondom hechtingen geplaatst die vanzelf vergaan (meestal na een dag of 7). Deze moeten dus later niet meer verwijderd worden.

### Na de operatie

Na de operatie wordt een steriel verbandje aangebracht. Dit mag 24 uur ter plaatse blijven.

### Ontslag

De nazorg bestaat uit het aanbrengen van antibacteriële zalf ter hoogte van de hechtingen. Dit doe je 2 maal per dag. Je mag douchen, maar je neemt 2 weken best geen bad.

Je mag geen sexuele betrekkingen hebben gedurende 3 weken.

De eerste dagen kan je een pijnlijk gevoel hebben, waarvoor je paracetamol tabletten kan innemen (maximaal 4 x 1 gram per dag).

### **Mogelijke gevolgen van de ingreep**

Een branderig gevoel tijdens het plassen kan enkele dagen duren. Bij doorplassen verdwijnt dit meestal weer.

Op de plaats van de hechtingen kunnen korstjes ontstaan die pijnlijk kunnen zijn door schaven van de huid of het ondergoed. De eikel ziet er mogelijk gedurende enkele dagen rood en gezwollen uit. Dit is normaal.

### **Wanneer contact opnemen?**

Als de wonde rood wordt met etterig verlies, kan dit wijzen op een ontsteking. Je contacteert dan best de huisarts of je uroloog voor nazicht.

Mocht je na het lezen van deze folder nog vragen hebben, stel ze dan gerust aan de arts of aan de verpleging.  
De dienst urologie wenst je een spoedig herstel!



### ZNA Middelheim

Lindendreef 1  
2020 Antwerpen  
**03 280 31 11** algemeen  
**03 280 30 03** raadplegingen

### ZNA Koningin Paola Kinderziekenhuis

Lindendreef 1  
2020 Antwerpen  
**03 280 31 11** algemeen  
**03 280 30 03** raadplegingen

### ZNA Stuivenberg

Lange Beeldekensstraat 267  
2060 Antwerpen  
**03 217 71 11** algemeen  
**03 217 77 70** raadplegingen

### ZNA Sint-Erasmus

Luitenant Lippenslaan 55  
2140 Borgerhout  
**03 270 80 11** algemeen  
**03 270 77 70** raadplegingen

### ZNA Jan Palfijn

Lange Bremstraat 70  
2170 Merksem  
**03 640 21 11** algemeen  
**03 640 20 20** raadplegingen

### ZNA Hoge Beuken

Commandant Weynsstraat 165  
2660 Hoboken  
**03 830 90 90** algemeen  
**03 280 30 03** raadplegingen