

Tyverb® (lapatinib)



Tyverb®, met als werkzame stof lapatinib, wordt gebruikt om **uitgezaaide HER2 positieve borstkanker** te behandelen. Tyverb® wordt afhankelijk van de ziekte **gecombineerd** met een ander antikankergeneesmiddel zoals **Xeloda® (capecitabine)**, wanneer de borstkanker niet reageert op eerdere behandeling. De combinatie met **Herceptin® (trastuzumab)** wordt gebruikt bij een niet-hormoongevoelige borstkanker na een eerdere behandeling. De combinatie Tyverb® met **een aromatase remmer, bijvoorbeeld Femara® (letrozol)** wordt gebruikt bij een hormoongevoelige borstkanker die tot nu toe niet in aanmerking komt voor chemotherapie.



Tyverb® bindt in kankercellen aan specifieke eiwitten, de zogenaamde proteïnekinase, om zo de werking ervan te blokkeren. Een gevolg hiervan is dat de **kankercellen niet meer** in staat zijn om te **groeien** of om zich te **vermenigvuldigen** en daardoor **afsterven**.



Elke tablet Tyverb® bevat 250 mg lapatinib. De aanbevolen **dagelijkse dosis** is **afhankelijk van het type borstkanker**. Als de nevenwerkingen te zwaar doorwegen kan de arts in overleg met jou de dosis Tyverb® verminderen of kan de behandeling tijdelijk onderbroken worden.



Neem **éénmaal per dag, op een vast tijdstip** de aanbevolen dosis in met een glas water.

Dagelijkse dosis: ... mg = ... tabletten Tyverb® 250 mg

Je mag de dagelijkse dosis **NIET** verdelen over de dag. Je neemt de tabletten na elkaar in.



Neem Tyverb® **ALTIJD ZONDER voedsel** in. Dit betekent dat je Tyverb® ten minste **1 uur vóór of ten minste 1 uur na de maaltijd** moet innemen.

Slik de tabletten **in hun geheel** door met water, na elkaar. Je mag de tabletten **niet breken, fijnmalen** of erop **kauwen**.



Als je een **dosis** bent **vergeten**, neem dan de volgende dosis in volgens het gebruikelijke schema. Neem **geen dubbele dosis** om de vergeten tablet(ten) in te halen.



Tijdens een behandeling met Tyverb® mag je geen **pompelmoes, sterfruit, granaatappel** en producten op basis van **Sint-Janskruid** gebruiken.

Als je tijdens je behandeling met Tyverb® nog **andere medicatie, kruiden, homeopathische middelen of voedingssupplementen** inneemt of overweegt in te nemen, meld dit dan aan je arts of apotheker.



Tyverb® kan de werking van je lever beïnvloeden en andere klachten veroorzaken. Je arts zal daarom regelmatig de leverenzymen via bloedafname controleren. Daarnaast zal je arts je hart- en longfunctie opvolgen.



- Het effect van Tyverb® op je vermogen om een **voertuig te besturen** of een **machine te gebruiken**, kan niet worden voorspeld. Wees dus bijzonder **voorzichtig** wanneer je veel last ondervindt van nevenwerkingen tijdens je behandeling met Tyverb®

Zoals elk geneesmiddel kan ook Tyverb® nevenwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. Volgende **nevenwerkingen** komen **zeer vaak** voor (bij meer dan 1/10 patiënten):



- ✓ Hoofdpijn
- ✓ Opvliegers
- ✓ Slapeloosheid
- ✓ Verlies van eetlust
- ✓ Misselijkheid, braken
- ✓ Diarree of moeilijke stoelgang (obstipatie), buikpijn
- ✓ Hoesten, kortademigheid (dyspneu)
- ✓ Neusbloeding
- ✓ Mondslijmvliesontsteking (pijn en blaasjes of zweertjes in de mond)
- ✓ Huidproblemen: huiduitslag (rash), jeuk, rode en droge huid, puistjes
- ✓ Hand-voet syndroom: huidreactie op de handpalmen of voetzolen, waaronder tintelingen, doof gevoel, zwelling of rood worden
- ✓ Haaruitval (alopecia)
- ✓ Pijn in de ledematen, rugpijn en gewrichtspijn
- ✓ Vermoeidheid, algemene zwakte



Contacteer het behandelend team:

- ✓ Als je veel last ondervindt van bovenvermelde nevenwerkingen
- ✓ Als je te veel van Tyverb® hebt ingenomen
- ✓ Bij allergische reacties: jeukende huiduitslag met bulten, piepende ademhaling of moeilijk ademen, gezwollen oogleden, lippen of tong, pijn in de spieren of gewrichten
- ✓ Als je de eerste verschijnselen van diarree (zachte ontlasting) opmerkt
- ✓ Als je uitslag, droge en jeukende huid hebt



Noteer hier je vragen of specifieke bijwerkingen die je wil bespreken tijdens de volgende consultatie.



Contactgegevens ziekenhuis

