



Trastuzumab deruxtecan (Enhertu®)

Je arts heeft **Trastuzumab deruxtecan (Enhertu®)** voorgeschreven als onderdeel van je behandeling. We geven je in deze infofiche graag meer uitleg over de werking, het verloop en mogelijke bijwerkingen van je behandeling.

Hoe werkt mijn behandeling?



Antilichaam-geneesmiddelconjugaat: Een celremmend geneesmiddel wordt rechtstreeks aan kankercellen afgegeven. Het bestaat uit 2 belangrijke delen:

Trastuzumab is een **antilichaam** dat zich specifiek het HER2-antigeen op bepaalde kankercellen (ook HER2-positieve kankercellen genoemd) zal herkennen en zich hieraan zal binden.

Deruxtecan is een **celremmend geneesmiddel** om kankercellen te vernietigen of de groei van kankercellen af te remmen.

Hoe verloopt mijn behandeling?

- Je behandeling wordt toegediend in het **dagziekenhuis Oncologisch Centrum Antwerpen**
- Je afspraak verloopt als volgt:



- Je behandeling wordt toegediend in periodes, die **cycli** worden genoemd. **1 cyclus duurt 21 dagen met 1 toediening per cyclus.** Het totaal aantal cycli wordt bepaald door je arts.
- Hieronder geven we je een overzicht van je behandelingschema.

Cyclus van 21 dagen	Geneesmiddel	Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5-21	Ter info
	Spoelvloeistof						Voorspoeling
	Netupitant 300mg+ palonosetron 0.5mg						Tegen misselijkheid en braken
	Dexamethasone 8mg						Tegen allergische reacties en misselijkheid.
	Trastuzumab deruxtecan (Enhertu®)						Antilichaam-geneesmiddelconjugaat Eerste infuus loopt gedurende 90 min. Als dit goed verloopt, kan vanaf de tweede cyclus het infuus over 30 minuten gegeven worden.
	Olanzapine 5mg						Tegen misselijkheid en braken. Indien nodig 1 tablet 's avonds.
	Spoelvloeistof						10 minuten spoelen van infuusleiding. Nadien verwijderen van infuus.

Dit is een standaardschema. De behandel tijd en ondersteunde medicatie kan individueel wijzigen

Wat zijn mogelijke bijwerkingen van mijn behandeling?

Elke behandeling kan bijwerkingen veroorzaken. De ernst van de bijwerkingen is afhankelijk van de gebruikte producten en kan individueel verschillen. Meer informatie over bijwerkingen en preventieve maatregelen vind je terug in de brochure 'Gids bij je kankerbehandeling met medicijnen'. Volgende bijwerkingen zijn specifiek voor je behandeling:

- Misselijkheid en braken
- Ongewone vermoeidheid
- Haarverlies
- Huidveranderingen: huiduitslag, huidhyperpigmentatie en huidverkleuring
- Minder witte bloedcellen: verhoogde vatbaarheid voor infecties
- Diarree/Constipatie
- Ontstoken mondslijmvlies en droge mond
- Verstoorde leverwaarden
- Minder rode bloedcellen (bloedarmoede)
- Spierpijn
- Minder bloedplaatjes
- Verlaagd kaliumgehalte
- Oogproblemen: droge ogen, wazig zicht
- Overgevoeligheidsreactie
- Allergische of overgevoeligheidsreactie
- ILD (interstitiële longziekte): Trastuzumab deruxtecan kan in de loop van de behandeling een soort 'allergische longontsteking' veroorzaken (zeldzaam). Moet u abnormaal hoesten, gelieve dit steeds te melden.
- Problemen met hart (zeldzaam): vermindering van de hartfunctie (pompfunctie van het hart). Er wordt voor de start van de behandeling en later regelmatig een hartonderzoek uitgevoerd, zodat eventuele problemen tijdig kunnen opgespoord worden. Symptomen van een hartfunctiedaling zijn kortademigheid en gezwollen voeten. Dit is van voorbijgaande aard en na herstel kan de behandeling worden verdergezet.

Aandachtspunten bij je behandeling:

- Het is belangrijk om te vermelden **welke andere geneesmiddelen** je neemt (ook als het gaat over voedingssupplementen, homeopathische middelen of vitaminen), want die kunnen mogelijk de werking van je behandeling beïnvloeden. Gelieve een overzicht van je thuismedicatie mee te nemen en te bespreken tijdens je volgende consultatie.
- Een **overgevoeligheidsreactie** kan voorkomen tijdens de toediening van Trastuzumab deruxtecan. Mogelijke symptomen zijn huiduitslag, roodheid van het gelaat, een gevoel van benauwdheid, snelle hartslag, lage bloeddruk, koorts of rillingen. Ter preventie wordt steeds een voorbehandeling met dexamethasone voorzien. De eerste toediening wordt gegeven over een lagere snelheid (over 90 minuten), indien goed verdragen kan vanaf de tweede toediening het infuus over 30 minuten gegeven worden. Merk je toch één van deze symptomen tijdens je behandeling? Waarschuw dan onmiddellijk je behandelend team.



Contacteer je behandelend team als een van de volgende problemen optreedt:

Koorts van 38°C of hoger of koude rillingen. Trastuzumab deruxtecan kan een daling van de witte bloedcellen veroorzaken, waardoor je vatbaarder en minder weerbaar bent tegen infecties. Bij koorts (temperatuur van 38°C of hoger) of koude rillingen is contact met het behandelteam aangewezen om een bloedname en nazicht in het ziekenhuis te organiseren.

Contactgegevens Oncologisch Centrum Antwerpen

Oncologisch centrum Antwerpen	☐ ZAS Augustinus	☐ ZAS Middelheim	☐ ZAS Palfijn
Dagziekenhuis	03 443 36 69	03 280 40 12	03 640 28 02
Verpleegafdeling	03 443 35 12	03 280 34 72	03 640 25 61
Consultatie	03 443 37 37	03 280 34 03	03 640 28 13
Centraal nummer	03 443 30 11	03 280 31 11	03 640 21 11
Spoed	03 443 39 00	03 280 22 13	03 640 20 00