



Infofiche carboplatine-paclitaxel-dostarlimab

Je arts heeft **carboplatine-paclitaxel-dostarlimab** voorgeschreven als onderdeel van je behandeling. We geven je in deze infofiche graag meer uitleg over de werking, het verloop en mogelijke bijwerkingen van je behandeling.

Hoe werkt mijn behandeling?



Chemotherapie: Je krijgt 2 geneesmiddelen, carboplatine en paclitaxel, toegediend die de **celdeling afremmen** en zo vooral sneldelende cellen, zoals **kankercellen**, beschadigen. Deze geneesmiddelen worden ook cytostatica of celremmende geneesmiddelen genoemd



Immuuntherapie: Je krijgt een geneesmiddel, dostarlimab, toegediend dat je **eigen immuunsysteem stimuleert om kankercellen te vernietigen**. Bepaalde tumoren gebruiken mechanismen die de afweercellen als het ware verlammen. Immuuntherapie kan die afweercellen opnieuw activeren, zodat je immuunsysteem zich weer kan verdedigen tegen kankercellen.

Hoe verloopt mijn behandeling?

- Je behandeling wordt toegediend **op de verpleegafdeling van het Oncologisch Centrum Antwerpen**.
- Je afspraak verloopt als volgt:



- Je behandeling wordt toegediend in periodes, die **cycli** worden genoemd. **1 cyclus duurt 21 dagen en omvat een opname op de verpleegafdeling met 1 overnachting**. Het totaal aantal cycli wordt bepaald door je arts.
- Hieronder geven we je een overzicht van je behandelingschema.

Cyclus
van 21
dagen

Geneesmiddel	Dag -1	Dag 1	Dag 2	Ter info
Dexamethason 8mg				Tegen misselijkheid en allergische reacties Inname van 1 capsule de avond vooraf (20u)
Dexamethason 8mg, Akynzeo, Cetirizine				Tegen misselijkheid en allergische reacties Inname minstens 1 uur voor start van chemo
Spoeler				Ter bescherming van de nieren
Dostarlimab				Immuuntherapie Loopt gedurende 30 minuten
spoelvloeistof				10 minuten spoelen van leiding
Paclitaxel				Chemo Loopt gedurende 3 uur
spoelvloeistof				10 minuten spoelen van leiding
Carboplatine				Chemo Loopt gedurende 1 uur
spoelvloeistof				10 minuten spoelen van leiding

Dit is een standaardschema. De behandel tijd en ondersteunde medicatie kan individueel wijzigen.

Wat zijn mogelijke bijwerkingen van mijn behandeling?

Elke behandeling kan bijwerkingen veroorzaken. De ernst van de bijwerkingen is afhankelijk van de gebruikte producten en kan individueel verschillen. Meer informatie over bijwerkingen en preventieve maatregelen vind je terug in de brochure 'Gids bij je kankerbehandeling met medicijnen'. Volgende bijwerkingen zijn specifiek voor je behandeling:

Paclitaxel- carboplatine

- Misselijkheid en braken
- Minder witte bloedcellen: verhoogd risico op infectie
- Minder rode bloedcellen: vermoeidheid
- Minder bloedplaatjes: risico op bloedingen
- Ontstoken mondslimvlies en droge mond
- Diarree en constipatie
- Haarverlies
- Tintelingen of voos gevoel in vingers/tenen
- Nagelveranderingen
- Allergische of overgevoelighedsreacties
- Ongewone vermoeidheid
- Spierpijn
- Irritatie van slijmvliezen van ogen (vb. tranende ogen en neus (vb. korstvorming)
- Ontregelde bloedsuikerspiegel (tgv premedicatie dexamethasone)

Dostarlimab:

Immuuntherapie kan een ongewenste ontstekingsreactie, ook 'auto-immuunreactie' genoemd, veroorzaken op verschillende plaatsen in het lichaam. Deze bijwerkingen kunnen voorkomen op elk moment tijdens de behandeling en zelfs nadat je behandeling klaar is. Hieronder worden de symptomen van een auto-immuunreactie beschreven voor de organen die het meest frequent betrokken zijn. Je kan last krijgen van meer dan één bijwerking tegelijk. **Het is belangrijk om alle verschijnselen direct te melden aan je behandelend team, zodat een auto-immuunreactie tijdig kan worden herkend en een geschikte behandeling kan worden opgestart.**

- Hormonale verstoring (ter hoogte van de bijnieren, schildklier, hypofyse): snelle hartslag, gewichtsverlies of gewichtstoename, duizeligheid of flauwvallen, hoofdpijn, meer honger of dorst hebben dan normaal, meer of minder (hoeveelheid) urine, vaker moeten plassen, gedragsveranderingen (verminderd libido, prikkelbaarheid of vergeetachtigheid)
- Darmontsteking: diarree (soms met bloed of slijmvlies), hevige buikpijn, misselijkheid
- Leverontsteking: vooral merkbaar in je bloed (verstoorde leverwaarden), mogelijks ook symptomen zoals misselijkheid of braken, minder honger hebben, pijn in de bovenbuik, gele verkleuring van het oogwit of de huid, donkere urine
- Longontsteking: prikkeling in de keel, hoest, benauwdheid, piepende ademhaling, kortademigheid of koorts
- Nierontsteking: minder plassen, donkere urine, benauwdheid, onderhuidse vochttopstapeling (oedeem)

Dostarlimab kan droge huid en huiduitslag veroorzaken. Mogelijke symptomen zijn: droge/schilferige huid met of zonder jeuk, puistjes, huiduitslag, roodheid, veranderingen van de huidkleur.

Aandachtspunten bij je behandeling:

- Het is belangrijk om te vermelden **welke andere geneesmiddelen** je neemt (ook als het gaat over voedingssupplementen, homeopathische middelen of vitamines), want die kunnen mogelijk de werking van je behandeling beïnvloeden. Gelieve een overzicht van je thuismedicatie mee te nemen en te bespreken tijdens je volgende consultatie.
- Een **overgevoelighedsreactie** kan optreden tijdens het toedienen van Paclitaxel. Mogelijke symptomen zijn huiduitslag, roodheid van het gelaat, een gevoel van benauwdheid, snelle hartslag, lage bloeddruk, koorts of rillingen, lage rugpijn. Ter preventie wordt een voorbehandeling met dexamethasone en cetirizine voorzien. Merk je toch één van deze symptomen tijdens je behandeling? Waarschuw dan onmiddellijk je behandelend team.
- Paclitaxel: Als dit geneesmiddel onbedoeld buiten het bloedvat terecht komt (ook '**extravasatie**' genoemd), kan het weefselschade veroorzaken. Merk je pijn en/of een zichtbare zwelling op tijdens de toediening? Waarschuw dan onmiddellijk je behandelend team.



Contacteer je behandelend team als een van de volgende problemen optreedt:

Koorts van 38°C of hoger of koude rillingen. Chemotherapie veroorzaakt een daling van de witte bloedcellen waardoor je vatbaarder en minder weerbaar bent tegen infecties. Bij koorts (temperatuur van 38°C of hoger) of koude rillingen is contact met het behandelteam aangewezen om een bloedname en nazicht in het ziekenhuis te organiseren.

Contactgegevens Oncologisch Centrum Antwerpen

Oncologisch centrum Antwerpen	<input type="checkbox"/> ZAS Augustinus	<input type="checkbox"/> ZAS Middelheim	<input type="checkbox"/> ZAS Palfijn
Dagziekenhuis	03 443 36 69	03 280 35 11	03 800 69 06
Verpleegafdeling	03 443 35 12	03 280 34 72	03 640 25 61
Consultatie	03 443 37 37		
Centraal nummer	03 443 30 11	03 280 31 11	03 640 21 11
Spoed	03 443 39 00	03 280 22 13	03 640 20 00