



Carboplatine- Paclitaxel

Je arts heeft **Carboplatine- Paclitaxel** voorgeschreven als onderdeel van je behandeling. We geven je in deze infofiche graag meer uitleg over de werking, het verloop en mogelijke bijwerkingen van je behandeling.

Hoe werkt mijn behandeling?



Chemotherapie: Je krijgt 2 geneesmiddelen, **Carboplatine en Paclitaxel**, toegediend die de **celdeling afremmen** en zo vooral sneldelende cellen, zoals **kankercellen, beschadigen**. Deze geneesmiddelen worden ook cytostatica of celremmende geneesmiddelen genoemd

Hoe verloopt mijn behandeling?

- Je behandeling wordt toegediend in het **dagziekenhuis van het Oncologisch Centrum Antwerpen**
- Je afspraak verloopt als volgt:



- Je behandeling wordt toegediend in periodes, die **cycli** worden genoemd. **1 cyclus duurt 21 dagen** met 3 toedieningen per cyclus, op **dag 1, dag 8 en dag 15**. Het totaal aantal cycli wordt bepaald door je arts.
- Hieronder geven we je een overzicht van je behandel-schema.

Geneesmiddel	Dag 1	Dag 2-7	Dag 8	Dag 9-14	Dag 15	Dag 16-21	Ter info
Spoelvloeistof							Voorspoeling
Netupitant 300mg + palonosetron 0.5mg							Tegen misselijkheid en braken. Toediening 30 minuten voor start chemo.
Cetirizine 10mg							Tegen allergische reacties en misselijkheid en braken. Inname 30 minuten voor start chemo.
Dexamethasone 8mg							Tegen allergische reacties. Inname 30 minuten voor start chemo.
Paclitaxel							Chemo Loopt gedurende 1 uur via infuus.
Spoelvloeistof							10 minuten spoelen van infuusleiding
Carboplatine							Chemo Loopt gedurende 1 uur via infuus.
Spoelvloeistof							10 minuten spoelen van infuusleiding. Nadien verwijderen van infuus.

Dit is een standaardschema. De behandel-tijd en ondersteunde medicatie kan individueel wijzigen.

Wat zijn mogelijke bijwerkingen van mijn behandeling?

Elke behandeling kan bijwerkingen veroorzaken. De ernst van de bijwerkingen is afhankelijk van de gebruikte producten en kan individueel verschillen. Meer informatie over bijwerkingen en preventieve maatregelen vind je terug in de brochure 'Gids bij je kankerbehandeling met medicijnen'. Volgende bijwerkingen zijn specifiek voor je behandeling:

- Misselijkheid en braken
- Minder witte bloedcellen: verhoogde vatbaarheid voor infecties
- Minder rode bloedcellen (bloedarmoede)
- Ontstoken mondslijmvlies en droge mond
- Diarree en constipatie
- Haarverlies
- Tintelingen of voos gevoel in vingers/tenen
- Nagelveranderingen
- Allergische of overgevoeligheidsreacties
- Ongewone vermoeidheid
- Irritatie van slijmvlies van ogen (bv. tranende ogen) en neus (bv. korstvorming en soms bloedverlies bij snuiten)
- Smaak- en reukveranderingen
- Spierpijn
- Minder bloedplaatjes: risico op bloedingen

Aandachtspunten bij je behandeling:

- Het is belangrijk om te vermelden **welke andere geneesmiddelen** je neemt (ook als het gaat over voedingssupplementen, homeopathische middelen of vitaminen), want die kunnen mogelijk de werking van je behandeling beïnvloeden. Gelieve een overzicht van je thuismedicatie mee te nemen en te bespreken tijdens je volgende consultatie.
- Een **overgevoeligheidsreactie** kan optreden tijdens het toedienen van Paclitaxel. Mogelijke symptomen zijn huiduitslag, roodheid van het gelaat, een gevoel van benauwdheid, snelle hartslag, lage bloeddruk, koorts of rillingen, lage rugpijn. Ter preventie wordt steeds een voorbehandeling met dexamethasone en cetirizine voorzien. Merk je toch één van deze symptomen tijdens je behandeling? Waarschuw dan onmiddellijk je behandelend team.
- Tijdens de behandeling kunnen we door middel van 'koudetherapie' de bloedvaten doen samentrekken waardoor de medicatie minder diep kan doordringen en de kans op nagelveranderingen en -beschadiging wordt verminderd. Bij gebruik van **hand-voet-koeling**, krijg je de eerste keer in het ziekenhuis één paar dunne handschoenen, die je nadien meebrengt bij iedere behandeling. Voor je eigen comfort, kan je (oude) sokken en eventueel een extra paar (oude) handschoenen meebrengen, waarvan de laatste teen- en vingerkootjes afgeknipt zijn.
- Paclitaxel: Als dit geneesmiddel onbedoeld buiten het bloedvat terechtkomt (ook '**extravasatie**' genoemd), kan het weefselschade veroorzaken. Merk je pijn en/of een zichtbare zwelling op tijdens de toediening? Waarschuw dan onmiddellijk je behandelend team.



Contacteer je behandelend team als een van de volgende problemen optreedt:

Koorts van 38°C of hoger of koude rillingen. Chemotherapie veroorzaakt een daling van de witte bloedcellen waardoor je vatbaarder en minder weerbaar bent tegen infecties. Bij koorts (temperatuur van 38°C of hoger) of koude rillingen is contact met het behandelteam aangewezen om een bloedname en nazicht in het ziekenhuis te organiseren.

Contactgegevens Oncologisch Centrum Antwerpen

Oncologisch centrum Antwerpen	☐ ZAS Augustinus	☐ ZAS Palfijn
Dagziekenhuis	03 443 36 69	03 640 28 02
Verpleegafdeling	03 432 60 00 (D1) 03 443 35 02 (D2)	03 640 25 61
Consultatie	03 443 37 37	03 640 28 13
Centraal nummer	03 443 30 11	03 640 21 11
Spoed	03 443 39 00	03 640 20 00