

Tucatinib (Tukysa®)



Tucatinib wordt gebruikt voor de behandeling van volwassenen met een vorm van borstkanker die **HER2-positieve borstkanker** wordt genoemd. Het wordt gebruikt wanneer de kanker zich buiten de oorspronkelijke tumor of naar andere delen van het lichaam heeft verspreid (gemetastaseerd). Tucatinib wordt enkel aangewend wanneer je reeds twee eerdere (anti-HER2 gerichte) behandelingen bent ondergaan en is dus een derde anti-HER2 gerichte behandelingsoptie. Het wordt toegediend in combinatie met **capecitabine en trastuzumab**.



Tucatinib bindt in kankercellen aan specifieke eiwitten zoals HER2, de zogenaamde proteïnekinasen, om zo de werking ervan te blokkeren. Een gevolg hiervan is dat de **kankercellen niet meer** in staat zijn om te **groeien** of om zich te **vermenigvuldigen** en daardoor **afsterven**.



Er bestaan 2 soorten filmomhulde tabletten: tabletten met 50 mg en met 150 mg tucatinib. De aanbevolen **dagelijkse dosis** is **300 mg tweemaal per dag**. Als de nevenwerkingen te zwaar doorwegen kan de arts in overleg met jou de dosis verminderen of kan de behandeling tijdelijk onderbroken worden.



Neem **tweemaal per dag, op een vast tijdstip** de aanbevolen hoeveelheid. Zorg dat er ongeveer 12 uur zit tussen de twee innames. Neem capecitabine binnen de 30 minuten na de maaltijd in. Trastuzumab wordt via injectie of infusie toegediend (zie innameschema).

Dagelijkse dosis : ... mg = ... tablet(ten) tucatinib ... mg per keer, tweemaal per dag
 ... mg = ... tablet(ten) capecitabine ... mg + ... tablet(ten) capecitabine ... mg
 per keer, tweemaal per dag, op dag 1 t/m 14 van iedere cyclus



Tucatinib **kan zowel met als zonder voedsel** worden ingenomen. Slik de tabletten in hun geheel door met een half glas water. Kauw niet op de tabletten en maak ze niet fijn.



- Als je een **dosis** tucatinib bent **vergeten**, neem dan de volgende dosis in volgens het gebruikelijke schema. Neem **geen dubbele dosis** in om de vergeten tabletten in te halen.
- Als u moet **overgeven** na het innemen van tucatinib, neem dan geen extra dosis, maar neem de volgende dosis volgens het gebruikelijke schema.



Tijdens een behandeling met tucatinib mag je geen **pompelmoes** of producten op basis van **Sint-Janskruid** gebruiken.

Als je tijdens je behandeling met tucatinib nog **andere medicatie, kruiden, homeopathische middelen of voedingssupplementen** inneemt of overweegt in te nemen, meld dit dan aan je arts of apotheker.



Tucatinib kan de werking van je lever beïnvloeden zonder dat je hiervan iets merkt en kan ook andere klachten veroorzaken. Daarom zal de arts regelmatig een bloedafname plannen om o.a. de leverfunctie te controleren.



Zoals elk geneesmiddel kan ook tucatinib nevenwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. Volgende **nevenwerkingen** komen **zeer vaak** voor (bij meer dan 1/10 patiënten):

- ✓ Diarree
- ✓ Misselijkheid en braken
- ✓ Vermoeidheid
- ✓ Mondslijmvliesontsteking (pijn en blaasjes of zweertjes in de mond)
- ✓ Leverproblemen (gezien in bloedafname): kan leiden tot jeuk, gele verkleuring van huid en ogen, donkere urine en pijn of ongemak rechts in de bovenbuik
- ✓ Verminderd aantal rode bloedcellen (anemie) met als gevolg vermoeidheid en algemene lichaamszwakte
- ✓ Huiduitslag
- ✓ Gewrichtspijn
- ✓ Gewichtsverlies
- ✓ Bloedneus



Contacteer het behandeld team :

- ✓ Als je veel last ondervindt van bovenvermelde nevenwerkingen
- ✓ Als je te veel van tucatinib hebt ingenomen
- ✓ Bij abnormale vermoeidheid, gele verkleuring van je huid en oogwit, donker of bruin verkleuring van je urine, misselijkheid, braken, verminderde eetlust,...
- ✓ Als je last hebt van aanhoudende en ernstige diarree of braken



Noteer hier je vragen of specifieke bijwerkingen die je wil bespreken tijdens de volgende consultatie.



Contactgegevens ziekenhuis

Patientidentificatie

Tucatinib – innameschema in combinatie met capecitabine en trastuzumab

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Tucatinib 	... mg	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀
		☾	☾	☾	☾	☾	☾	☾	☾	☾	☾	☾	☾	☾	☾	☾	☾	☾	☾	☾	☾	☾
Capecitabine 	... mg	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀								
		☾	☾	☾	☾	☾	☾	☾	☾	☾	☾	☾	☾	☾								
Trastuzumab	... mg																					

van .../.../....
tot .../.../....

 Tucatinib ... mg = ... tablet(ten) van ... mg

 Capecitabine ... mg = ... tablet(ten) van ... mg + ... tablet(ten) van ... mg