



Mirvetuximab soravtansine (Elahere®)

Je arts heeft **mirvetuximab soravtansine** voorgeschreven als onderdeel van je behandeling. We geven je in deze infofiche graag meer uitleg over de werking, het verloop en mogelijke bijwerkingen van je behandeling.

Hoe werkt mijn behandeling?



Antilichaam-geneesmiddelconjugaat: Een celremmend geneesmiddel wordt rechtstreeks aan kankercellen afgegeven. Het bestaat uit 2 belangrijke delen:

mirvetuximab is een **antilichaam** dat zich specifiek de folaat receptor- α op bepaalde kankercellen zal herkennen en zich hieraan zal binden.

soravtansine is een **celremmend geneesmiddel** om kankercellen te vernietigen of de groei van kankercellen af te remmen.

Hoe verloopt mijn behandeling?

- Je behandeling wordt toegediend **op de verpleegafdeling** of in het **dagziekenhuis van het Oncologisch Centrum Antwerpen**
- Je afspraak verloopt als volgt:



- Je behandeling wordt toegediend in periodes, die **cycli** worden genoemd. **1 cyclus duurt 21 dagen met 1 toediening per cyclus**. Het totaal aantal cycli wordt bepaald door je arts.
- Hieronder geven we je een overzicht van je behandelingschema.

Cyclus van 21 dagen	Geneesmiddel	Dag 1	Dag 2-21	Ter info
	Spoelvloeistof			Voorspoeling
	Solu-medrol 40mg			Tegen allergische reacties
	Cetirizine 10mg			Tegen allergische reacties
	Paracetamol 1g			Tegen koorts bij allergische reacties
	Palonosetron 0.25mg			Tegen misselijkheid en braken
	Mirvetuximab soravtansine			Antilichaam-geneesmiddelconjugaat Eerste infuus loopt gedurende 60-120 minuten, de snelheid wordt elk half uur opgedreven tot de maximumsnelheid. Als dit goed verloopt, kan vanaf de tweede cyclus het infuus aan de maximumsnelheid gegeven worden, dit infuus loopt dan gedurende 60-90 minuten.
	Spoelvloeistof			10 minuten spoelen van infuusleiding. Nadien verwijderen van infuus.
	Bevochtigende oogdruppel			Dagelijks 1-4x/dag 1 druppel in elk oog

Dit is een standaardschema. De behandel tijd en ondersteunde medicatie kan individueel wijzigen

Wat zijn mogelijke bijwerkingen van mijn behandeling?

Elke behandeling kan bijwerkingen veroorzaken. De ernst van de bijwerkingen is afhankelijk van de gebruikte producten en kan individueel verschillen. Meer informatie over bijwerkingen en preventieve maatregelen vind je terug in de brochure 'Gids bij je kankerbehandeling met medicijnen'. Volgende bijwerkingen zijn specifiek voor je behandeling:

- Oogproblemen: droge ogen, wazig zicht, gevoeligheid voor licht,...
- Misselijkheid en braken
- Diarree/constipatie/buikpijn
- Ongewone vermoeidheid
- Tintelingen of voos gevoel in vingers/tenen
- Hoofdpijn
- Minder rode bloedcellen (bloedarmoede)
- Minder bloedplaatjes
- Minder witte bloedcellen: verhoogde vatbaarheid voor infecties
- Huidveranderingen: huiduitslag
- Overgevoelighedsreactie
- Longontsteking (zeldzaam)

Aandachtspunten bij je behandeling:

- Het is belangrijk om te vermelden **welke andere geneesmiddelen** je neemt (ook als het gaat over voedingssupplementen, homeopathische middelen of vitaminen), want die kunnen mogelijk de werking van je behandeling beïnvloeden. Gelieve een overzicht van je thuismedicatie mee te nemen en te bespreken tijdens je volgende consultatie. Vermijd pompelmoes(sap) tijdens deze behandeling.
- Een **overgevoelighedsreactie** kan voorkomen tijdens de toediening van mirvetuximab soravtansine. Mogelijke symptomen zijn huiduitslag, roodheid van het gelaat, een gevoel van benauwdheid, snelle hartslag, lage bloeddruk, koorts of rillingen. Ter preventie wordt steeds een voorbehandeling met dexamethasone, cetirizine en paracetamol voorzien. Het eerste infuus loopt gedurende 60-120 minuten, de snelheid wordt elk half uur opgedreven tot de maximumsnelheid. Indien dit goed verdragen wordt, kan vanaf de tweede cyclus het infuus aan maximumsnelheid gegeven worden, dit infuus loopt dan 60-90 minuten. Merk je toch één van deze symptomen tijdens je behandeling? Waarschuw dan onmiddellijk je behandelend team.
- **Oogproblemen:** Ter preventie van droge ogen wordt aangeraden om dagelijks een bevochtigende oogdruppel/kunsttranen (zonder bewaarmiddel) te gebruiken. Andere tips die kunnen helpen zijn: warmtekompresen op je ogen leggen vóór het slapengaan, buitenkant van je ogen wassen, geen contactlenzen dragen en een zonnebril dragen overdag. De meeste oogproblemen verdwijnen spontaan na 14 dagen. Indien u veel last heeft van uw ogen of nieuwe klachten treden op, gelieve dan contact op te nemen met een oogarts.



Contacteer je behandelend team als een van de volgende problemen optreedt:

- Oogproblemen: Indien u veel last heeft van uw ogen of nieuwe klachten treden op, gelieve dan contact op te nemen met een oogarts

Contactgegevens Oncologisch Centrum Antwerpen

Oncologisch centrum Antwerpen	☐ ZAS Augustinus	☐ ZAS Middelheim	☐ ZAS Palfijn
Dagziekenhuis	03 443 36 69	03 280 40 12	03 640 28 02
Verpleegafdeling	03 432 60 00 (D1) 03 443 35 02 (D2)		03 640 25 61
Consultatie	03 443 37 37	03 280 34 03	03 640 28 13
Centraal nummer	03 443 30 11	03 280 31 11	03 640 21 11
Spoed	03 443 39 00	03 280 22 13	03 640 20 00