



Cisplatine-doxorubicine

Je arts heeft **cisplatine-doxorubicine (Adriablastina®)** voorgeschreven als onderdeel van je behandeling. We geven je in deze infofiche graag meer uitleg over de werking, het verloop en mogelijke bijwerkingen van je behandeling.

Hoe werkt mijn behandeling?



Chemotherapie: Je krijgt 2 geneesmiddelen, **cisplatine en doxorubicine**, toegediend die de celdeling afremmen en zo vooral sneldelevende cellen, zoals kankercellen, beschadigen. Deze geneesmiddelen worden ook cytostatica of celremmende geneesmiddelen genoemd.

Hoe verloopt mijn behandeling?

- Je afspraak verloopt als volgt:



- Je behandeling wordt toegediend in periodes, die **cycli** worden genoemd. **1 cyclus** duurt **21 dagen** en omvat **een opname met 3 overnachtingen** op een verpleegafdeling. Het totaal aantal cycli wordt bepaald door je arts.
- Hieronder geven we je een overzicht van je behandelingschema.

Cyclus van 21 dagen

Geneesmiddel	Dag -1	Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Ter info
Spoeler						<i>Ter bescherming van de nieren</i>
Dexamethason 12mg, Akynzeo						<i>Tegen misselijkheid/braken en allergische reacties 1 uur voor chemo</i>
Dexamethason 8mg						<i>Tegen misselijkheid en allergische reacties 's morgens bij ontbijt op dag 3-4-5</i>
Doxorubicine						Chemo Loopt gedurende 15 min
Spoelvloeistof						10 min spoelen van leiding
Cisplatine						Chemo Loopt gedurende 60 min
Mannitol						<i>Ter bescherming van de nieren</i>
Olanzapine						<i>Tegen misselijkheid en braken. 1 tablet 's avonds op dag 1-2-3-4</i>
Lonquex						<i>Stimuleert de aanmaak van witte bloedcellen Min 24 uur na beëindigen van chemo</i>

Dit is een standaardschema. De behandel tijd en ondersteunende medicatie kan individueel wijzigen.

Wat zijn mogelijke bijwerkingen van mijn behandeling?

Elke behandeling kan bijwerkingen veroorzaken. De ernst van de bijwerkingen is afhankelijk van de gebruikte producten en kan individueel verschillen. Meer informatie over bijwerkingen en preventieve maatregelen vind je terug in de brochure 'Gids bij je kankerbehandeling met medicijnen'. Volgende bijwerkingen zijn specifiek voor je behandeling:

- Problemen met hart
- Minder witte bloedcellen: verhoogde vatbaarheid voor infecties
- Huidveranderingen, gevoelig voor de zon
- Ontstoken mondslijmvlies en droge mond
- Misselijkheid en braken
- Diarree
- Haarverlies/haarverdunning
- Werking nieren en blaas
- Gewichtsverlies of gewichtstoename
- Vochttopstapeling (oedeem)
- Oorsuizingen en een verminderd gehoor
- Tintelingen of voos gevoel in vingers/tenen
- Minder rode bloedcellen: vermoeidheid
- Minder bloedplaatjes: meer risico op bloedingen

Aandachtspunten bij je behandeling:

- Het is belangrijk om te vermelden **welke andere geneesmiddelen** je neemt (ook als het gaat over voedingssupplementen, homeopathische middelen of vitaminen), want die kunnen mogelijk de werking van je behandeling beïnvloeden. Gelieve een overzicht van je thuismedicatie mee te nemen en te bespreken tijdens je volgende consultatie.
- Door **doxorubicine** is, tot enkele dagen na de therapie, **roodverkleuring van de urine** en soms het traanvocht mogelijk. De verkleuring is onschuldig en verdwijnt spontaan.
- **Cisplatine** kan aanleiding geven tot **verminderde nierwerking**. Daarom wordt er voor het starten van de chemotherapie veel vocht toegediend om de nieren te beschermen. Soms kan hierdoor vochtophoping ontstaan. Dit wordt opgevolgd tijdens uw verblijf aan de hand van uw gewicht. Zo nodig worden vochtafdrijvende middelen toegediend.
- **Doxorubicine** kan schadelijk zijn voor het **hart**. Hiervoor wordt er regelmatig een hartfunctieonderzoek uitgevoerd.
- **Doxorubicine**: Als dit geneesmiddel onbedoeld buiten het bloedvat terechtkomt (ook '**extravasatie**' genoemd), kan het weefselschade veroorzaken. Merk je pijn en/of een zichtbare zwelling op tijdens de toediening? Waarschuw dan onmiddellijk je behandelend team.
- Een overgevoeligheidsreactie kan optreden tijdens het toedienen van **cisplatine**. Mogelijke symptomen zijn huiduitslag, roodheid van het gelaat, een gevoel van benauwdheid, snelle hartslag, lage bloeddruk, koorts of rillingen. Merk je één van deze symptomen tijdens je behandeling? Waarschuw dan onmiddellijk je behandelend team.
- Je krijgt de inspuiting **Longuex** mee uit het ziekenhuis. Deze inspuiting wordt standaard toegediend op de dag na de (laatste) chemotoediening (minimum 24 uur en maximaal 72 uur nadien). Dit kan door een thuisverpleegkundige.



Contacteer je behandelend team als een van de volgende problemen optreedt:

Koorts van 38°C of hoger of koude rillingen. Chemotherapie veroorzaakt een daling van de witte bloedcellen waardoor je vatbaarder en minder weerbaar bent tegen infecties. Bij koorts (temperatuur van 38°C of hoger) of koude rillingen is contact met het behandelteam aangewezen om een bloedname en nazicht in het ziekenhuis te organiseren.

Contactgegevens Oncologisch Centrum Antwerpen

Oncologisch centrum Antwerpen	☐ ZAS Augustinus	☐ ZAS Middelheim	☐ ZAS Palfijn
Dagziekenhuis	03 443 36 69	03 280 40 12	03 640 28 06
Verpleegafdeling	03 443 35 01 (D1) 03 443 35 02 (D2)		03 640 25 61
Consultatie	03 443 37 37	03 280 34 03	03 640 28 13
Centraal nummer	03 443 30 11	03 280 31 11	03 640 21 11
Spoed	03 443 39 00	03 280 22 13	03 640 20 00

ZAS vzw • Kempenstraat 100, 2030 Antwerpen • BE 0862.382.656 • RPR Antwerpen
Erkenningsnummer 7/10009/31/000: ZAS Cadix, ZAS Elisabeth, ZAS Erasmus, ZAS Hoge Beuken, ZAS Joostens, ZAS Middelheim, ZAS Palfijn, ZAS Paola, ZAS Polikliniek Regatta, ZAS UKJA • Erkenningsnummer 7/10099/38/000: ZAS Augustinus, ZAS Polikliniek Hof ter Schelde, ZAS Sint-Jozef, ZAS Vincentius • Erkenningsnummer 7/20998/03/000: ZAS PZ Stuivenberg • Erkenningsnummer 7/25047/28/000: ZAS PVT Antwerpen