



Bevacizumab

Je arts heeft **Bevacizumab** voorgeschreven als onderdeel van je behandeling. We geven je in deze infofiche graag meer uitleg over de werking, het verloop en mogelijke bijwerkingen van je behandeling.

Hoe werkt mijn behandeling?



Doelgerichte therapie: Je krijgt een geneesmiddel, **Bevacizumab**, toegediend dat **doelgericht de werking van kankercellen verstoort**.

Bevacizumab is een **VEGF-remmer**: het bindt zich in kankercellen bindt aan een specifiek eiwit: de vasculaire endotheliale groeifactor (VEGF). Het VEGF- eiwit zorgt ervoor dat bloedvaten binnen tumoren kunnen groeien. Die leveren voedingsstoffen en zuurstof aan de tumor. Als het geneesmiddel bindt aan VEGF, blokkeert het de groei van bloedvaten naar de tumor. Zo wordt de groei van kankercellen voorkomen of vertraagd. VEGF-remmers worden ook VEGF-inhibitoren of anti-VEGF genoemd.

Hoe verloopt mijn behandeling?

- Je behandeling wordt toegediend in het **dagziekenhuis van het Oncologisch Centrum Antwerpen**
- Je afspraak verloopt als volgt:



- Je behandeling wordt toegediend in periodes, die **cycli** worden genoemd. **1 cyclus duurt 21 dagen met 1 toediening per cyclus**. Het totaal aantal cycli wordt bepaald door je arts.
- Hieronder geven we je een overzicht van je behandel-schema.

Cyclus van 21 dagen	Geneesmiddel	Dag 1	Dag 2-21	Ter info
	Spoelvloeistof			Voorspoeling
	Bevacizumab			Doelgerichte therapie 1 ^e keer: loopt gedurende 90 minuten via infuus, indien goed verdragen: 2 ^e keer: loopt gedurende 60 minuten via infuus, indien goed verdragen: vanaf 3 ^e keer: loopt gedurende 30 minuten via infuus
	Spoelvloeistof			10 minuten spoelen van infuusleiding. Nadien afkoppelen infuus.

Wat zijn mogelijke bijwerkingen van mijn behandeling?

Elke behandeling kan bijwerkingen veroorzaken. De ernst van de bijwerkingen is afhankelijk van de gebruikte producten en kan individueel verschillen. Meer informatie over bijwerkingen en preventieve maatregelen vind je terug in de brochure 'Gids bij je kankerbehandeling met medicijnen'. Volgende bijwerkingen zijn specifiek voor je behandeling:

- Hoge bloeddruk
- Verstoorde wondheling
- Hand-voet huidreactie
- Werking nieren en blaas
- Risico op bloedingen en trombose/embolie
- Allergische of overgevoeligheidsreactie

Aandachtspunten bij je behandeling:

- Het is belangrijk om te vermelden **welke andere geneesmiddelen** je neemt (ook als het gaat over voedingssupplementen, homeopathische middelen of vitaminen), want die kunnen mogelijk de werking van je behandeling beïnvloeden. Gelieve een overzicht van je thuismedicatie mee te nemen en te bespreken tijdens je volgende consultatie.
- **Urinedipstick:** Een behandeling met Bevacizumab doet de hoeveelheid eiwit in de urine stijgen. Daarom controleren we het eiwitgehalte in je urine. Dat gebeurt aan de hand van een 'urinedipstick test' op een urinestaal.
- Bevacizumab kan niet worden toegediend wanneer u een **operatie of kleine ingreep** dient te ondergaan. Gebruik ook geen bloedverdunners zonder dit eerst met uw arts te bespreken.
- Bevacizumab kan een reactie geven aan de **handen en voeten** met roodheid, zwelling, droogheid, gevoeligheid, tintelingen, pijn, eeltvorming of blaarvorming. Hydrateer je handen en voeten goed met een vochtinbrengende crème gedurende je hele behandeling. Vermijd druk en wrijving.
- Een **overgevoeligheidsreactie** tijdens het toedienen van Bevacizumab treedt zelden op. De eerste toediening wordt aan een tragere snelheid gegeven (over 90 min), indien goed verdragen kan de tweede toediening iets sneller gegeven worden (over 60 min), indien ook deze goed verdragen wordt kunnen alle daarop volgende toedieningen over 30 minuten gegeven worden. Mogelijke symptomen van een overgevoeligheidsreactie zijn huiduitslag, roodheid van het gelaat, een gevoel van benauwdheid, snelle hartslag, lage bloeddruk, koorts of rillingen. Merk je toch één van deze symptomen tijdens je behandeling? Waarschuw dan onmiddellijk je behandelend team.



Contacteer je behandelend team als een van de volgende problemen optreedt:

- Plots optredende en frequente bloedingen en blauwe plekken

Contactgegevens Oncologisch Centrum Antwerpen

Oncologisch centrum Antwerpen	☐ ZAS Augustinus	☐ ZAS Middelheim	☐ ZAS Palfijn
Dagziekenhuis	03 443 36 69	03 280 40 12	03 640 28 02
Verpleegafdeling	03 443 35 12	03 280 34 72	03 640 25 61
Consultatie	03 443 37 37	03 280 34 03	03 640 28 13
Centraal nummer	03 443 30 11	03 280 31 11	03 640 21 11
Spoed	03 443 39 00	03 280 22 13	03 640 20 00