

Mijnheer, Mevrouw,

Binnenkort ondergaat u een heelkundige ingreep. Na de operatie is een goede pijncontrole belangrijk voor uw comfort, maar ook voor een vlot herstel. Uw arts heeft gekozen voor een PCIA-pijnpomp, waarmee u zelf de hoeveelheid pijnmedicatie kunt controleren.

Deze brochure geeft meer informatie over de opvolging, bediening en mogelijke bijwerkingen van deze pijnpomp. Als u na het lezen nog vragen hebt, aarzel dan niet om deze te bespreken met uw behandelend arts of het verpleegkundig personeel.

1261/819/2 © GZA - februari 2016

Patiënt gecontroleerde intraveneuze analgesie: de PCIA pijnpomp patiënteninformatie

anesthesie
tel. + 32 3 443 36 13
fax + 32 3 443 30 29

campus Sint-Augustinus
Oosterveldlaan 24
2610 Wilrijk
tel. + 32 3 443 30 11

campus Sint-Vincentius
Sint-Vincentiusstraat 20
2018 Antwerpen
tel. + 32 3 285 20 00

campus Sint-Jozef
Molenstraat 19
2640 Mortsel
tel. + 32 3 444 12 11

www.gzaziekenhuizen.be

Wat is een PCIA pijnpomp?

PCIA staat voor “Patient gecontroleerde intraveneuze (via de infuuslijn) analgesie (pijnstilling)”. Dat wil zeggen dat u door middel van deze pomp uw pijn zelf kunt controleren. U moet dus niet wachten tot de verpleegkundige de pijnmedicatie heeft klaargemaakt en toegediend. Pijnmedicatie is noodzakelijk na een operatie. Het is belangrijk dat u niet wacht tot de pijn te erg wordt, alvorens uzelf een dosis toe te dienen. Het kan ook nuttig zijn een dosis toe te dienen voor de verzorging of voor mobilisatie.

Bediening van de pijnpomp

De pijnpomp wordt na de operatie in de ontwaakkamer aangeschakeld op een infuus in een ader. Het toestel is verbonden met een bedieningsknop die u bij pijn kort kunt indrukken.

De pijnpomp is computergestuurd en volgt een gepersonaliseerde programmatie. De toegediende dosis is berekend door uw arts en de pijnpomp is zo ingesteld dat een overdosis onmogelijk is, zelfs als u te veel zou drukken. Het effect van de medicatie laat 5 tot 15 minuten op zich wachten.

Gebruik de PCIA-pijnpomp om uw pijn draaglijk te maken.

Medicatie

De pijnstillers die in de PCIA-pijnpomp wordt gebruikt, is van het type morfine. De verpleegkundige dient u op geregelde tijdstippen nog andere pijnstillers toe zodat de dosis morfine laag kan blijven, wat meteen de nevenwerkingen ervan beperkt. Deze manier van werken garandeert een optimaal resultaat met een zo laag mogelijke dosis product. Het gebruik van morfine voor de behandeling van pijn na een operatie brengt geen risico op gewenning met zich mee.

Mogelijke bijwerkingen

Bij het gebruik van de PCIA-pijnpomp kunnen misselijkheid en braken voorkomen. Als deze onaangename bijwerkingen zich voordoen, meldt u dit aan de verpleging. Zij kunnen hiervoor aangepaste medicatie toedienen via het infuus. Wanneer u last hebt van deze nevenwerkingen, moet u niet minderen met het gebruik van de pijnpomp omdat de pijn zelf immers ook deze nevenwerkingen kan veroorzaken.

Opvolging

De verpleegkundige van de afdeling zal regelmatig naar uw pijn vragen met behulp van een pijnlat (zie afbeelding). Het cijfer 0 (links) staat voor geen pijn en het cijfer 10 (rechts) staat voor de ergst denkbare pijn. Daartussen scoort u zelf de ernst van uw pijn.



De pijnpomp blijft in functie van de operatie meerdere dagen bij u. Nadien schakelen we over naar minder krachtige pijnmedicatie via het infuus of onder de vorm van tabletten.