



Folfiri-Bevacizumab

Je arts heeft **Folfiri-Bevacizumab** voorgeschreven als onderdeel van je behandeling. . Deze behandeling bestaat uit vier onderdelen: Bevacizumab (infuus), Irinotecan (infuus), 5-FU (infuus) en 5-FU (pomp voor toediening thuis). We geven je in deze infofiche graag meer uitleg over de werking, het verloop en mogelijke bijwerkingen van je behandeling.

Hoe werkt mijn behandeling?



Chemotherapie: Je krijgt 2 geneesmiddelen, **Irinotecan en 5-FU** (in infuus en pomp), toegediend die de **celdeling afremmen** en zo vooral sneldividende cellen, zoals **kankercellen, beschadigen**. Deze geneesmiddelen worden ook cytostatica of celremmende geneesmiddelen genoemd



Doelgerichte therapie: Je krijgt een geneesmiddel, **Bevacizumab**, toegediend dat **doelgericht de werking van kankercellen verstoort**.

Bevacizumab is een **VEGF-remmer**: het bindt zich in kankercellen aan een specifiek eiwit: de vasculaire endotheliale groeifactor (VEGF). Het VEGF- eiwit zorgt ervoor dat bloedvaten binnen tumoren kunnen groeien. Die leveren voedingsstoffen en zuurstof aan de tumor. Als het geneesmiddel bindt aan VEGF, blokkeert het de groei van bloedvaten naar de tumor. Zo wordt de groei van kankercellen voorkomen of vertraagd. VEGF-remmers worden ook VEGF-inhibitoren of anti-VEGF genoemd.

Hoe verloopt mijn behandeling?

- Je behandeling wordt toegediend in het **dagziekenhuis van het Oncologisch Centrum Antwerpen**
- Je afspraak verloopt als volgt:



- Je behandeling wordt toegediend in periodes, die **cycli** worden genoemd. **1 cyclus duurt 14 dagen met 1 toediening per cyclus**. Het totaal aantal cycli wordt bepaald door je arts.
- Hieronder geven we je een overzicht van je behandelingschema.

Cyclus
van 14
dagen

Geneesmiddel	Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4-14	Ter info
Spoelvloeistof					Voorspoeling
Palonosetron 250µg/5ml					Tegen misselijkheid en braken. Toediening minstens 30 minuten voor start chemo.
Dexamethasone 8mg					Tegen misselijkheid en braken en allergische reacties. Inname minstens 30 minuten voor start chemo.
Bevacizumab					Doelgerichte therapie 1 ^e keer: loopt gedurende 90 minuten via infuus, indien goed verdragen: 2 ^e keer: loopt gedurende 60 minuten via infuus, indien goed verdragen: vanaf 3 ^e keer: loopt gedurende 30 minuten via infuus
Spoelvloeistof					10 minuten spoelen van infuusleiding.
Atropine 0.25mg					Tegen acute diarree. Onderhuidse inspuiting 15 minuten voor start chemo.
Irinotecan					Chemo Loopt gedurende 45 minuten via infuus.
Spoelvloeistof					10 minuten spoelen van infuusleiding.
5-FU + levofolinezuur					Chemo Loopt gedurende 15 minuten via infuus.
Spoelvloeistof					10 minuten spoelen van infuusleiding.
5-FU pomp			Pomp thuis laten afkoppelen		Chemo Elastomeerpomp loopt gedurende 44 uur. Laten afkoppelen op dag 3 na 14u.

Dit is een standaardschema. De behandeltdag en ondersteunde medicatie kan individueel wijzigen.

Wat zijn mogelijke bijwerkingen van mijn behandeling?

Elke behandeling kan bijwerkingen veroorzaken. De ernst van de bijwerkingen is afhankelijk van de gebruikte producten en kan individueel verschillen. Meer informatie over bijwerkingen en preventieve maatregelen vind je terug in de brochure 'Gids bij je kankerbehandeling met medicijnen'. Volgende bijwerkingen zijn specifiek voor je behandeling:

- Diarree en constipatie
- Misselijkheid en braken
- Minder witte bloedcellen: verhoogde vatbaarheid voor infecties
- Minder rode bloedcellen (bloedarmoede)
- Ontstoken mondslijmvlies en droge mond
- Beperkt/zeer weinig haarverlies
- Ongewone vermoeidheid
- Minder bloedplaatjes
- Hoge bloeddruk
- Verstoorde wondheling
- Hand-voet huidreactie
- Werking nieren en blaas
- Risico op bloedingen en trombose/embolie

Aandachtspunten bij je behandeling:

- Het is belangrijk om te vermelden **welke andere geneesmiddelen** je neemt (ook als het gaat over voedingssupplementen, homeopathische middelen of vitaminen), want die kunnen mogelijk de werking van je behandeling beïnvloeden. Gelieve een overzicht van je thuismedicatie mee te nemen en te bespreken tijdens je volgende consultatie.
- Urinedipstick:** Een behandeling met Bevacizumab doet de hoeveelheid eiwit in de urine stijgen. Daarom controleren we het eiwitgehalte in je urine. Dat gebeurt aan de hand van een 'urinedipstick test' op een urinestaal.
- Bevacizumab kan niet worden toegediend wanneer u een **operatie of kleine ingreep** dient te ondergaan. Gebruik ook geen bloedverdunners zonder dit eerst met uw arts te bespreken.
- Bevacizumab kan een reactie geven aan de **handen en voeten** met roodheid, zwelling, droogheid, gevoeligheid, tintelingen, pijn, eeltvorming of blaarvorming. Hydrateer je handen en voeten goed met een vochtinbrengende crème gedurende je hele behandeling. Vermijd druk en wrijving.
- Een **overgevoeligheidsreactie** tijdens het toedienen van Bevacizumab treedt zelden op. De eerste toediening wordt aan een tragere snelheid gegeven (over 90 min), indien goed verdragen kan de tweede toediening iets sneller gegeven worden (over 60 min), indien ook deze goed verdragen wordt kunnen alle daarop volgende toedieningen over 30 minuten gegeven worden. Mogelijke symptomen van een overgevoeligheidsreactie zijn huiduitslag, roodheid van het gelaat, een gevoel van benauwdheid, snelle hartslag, lage bloeddruk, koorts of rillingen. Merk je toch één van deze symptomen tijdens je behandeling? Waarschuw dan onmiddellijk je behandelend team.



Contacteer je behandelend team als een van de volgende problemen optreedt:

- Koorts van 38°C of hoger of koude rillingen. Chemotherapie veroorzaakt een daling van de witte bloedcellen waardoor je vatbaarder en minder weerbaar bent tegen infecties. Bij koorts (temperatuur van 38°C of hoger) of koude rillingen is contact met het behandelteam aangewezen om een bloedname en nazicht in het ziekenhuis te organiseren.
- Meer dan 48 uren diarree
- Meer dan 24 uren hevig braken
- Pijnlijke mond of keel
- Plots optredende en frequente bloedingen en blauwe plekken

Contactgegevens Oncologisch Centrum Antwerpen

Oncologisch centrum Antwerpen	☐ ZAS Augustinus	☐ ZAS Middelheim	☐ ZAS Palfijn
Dagziekenhuis	03 443 36 69	03 280 40 12	03 640 28 02
Verpleegafdeling	03 443 35 12	03 280 34 72	03 640 25 61
Consultatie	03 443 37 37	03 280 34 03	03 640 28 13
Centraal nummer	03 443 30 11	03 280 31 11	03 640 21 11
Spoed	03 443 39 00	03 280 22 13	03 640 20 00

ZAS vzw • Kempenstraat 100, 2030 Antwerpen • BE 0862.382.656 • RPR Antwerpen
Erkenningsnummer 7/10009/31/000: ZAS Cadix, ZAS Elisabeth, ZAS Erasmus, ZAS Hoge Beuken, ZAS Joostens, ZAS Middelheim, ZAS Palfijn, ZAS Paola, ZAS Polikliniek Regatta, ZAS UKJA • Erkenningsnummer 7/10099/38/000: ZAS Augustinus, ZAS Polikliniek Hof ter Schelde, ZAS Sint-Jozef, ZAS Vincentius • Erkenningsnummer 7/20998/03/000: ZAS PZ Stuivenberg • Erkenningsnummer 7/25047/28/000: ZAS PVT Antwerpen