

Tafinlar® (dabrafenib)



Tafinlar®, met dabrafenib als werkzame stof, wordt gebruikt bij het behandelen van een **melanoom** (een type huidkanker), dat uitgezaaid is naar andere delen van het lichaam of niet verwijderd kan worden met een operatie. Tafinlar® wordt ook in combinatie met Mekinist® (trametinib) gebruikt om een melanoom of **gevorderde niet-kleincellige longkanker (NSCLC)** te behandelen.



Tafinlar® richt zich op specifieke eiwitten, de zogenaamde proteïnekinasen, om zo de werking ervan te blokkeren. Een gevolg hiervan is dat de **kankercellen niet meer** in staat zijn om te **groeien** of om zich te **vermenigvuldigen** en daardoor **afsterven**.



Er bestaan 2 soorten Tafinlar® capsules: capsules met 50 mg en 75 mg dabrafenib. De aanbevolen **dagelijkse dosis** is **300 mg**. Als de nevenwerkingen te zwaar doorwegen of je tekenen van infectie vertoont (koorts ($\geq 38^\circ\text{C}$)) kan de arts in overleg met jou de dosis verminderen of kan de behandeling tijdelijk onderbroken worden.



Neem **tweemaal per dag op een vast tijdstip** de aanbevolen hoeveelheid Tafinlar® in met een half glas water.

Dagelijkse dosis: ... mg = ... capsules Tafinlar® ... mg per keer, tweemaal per dag



Neem Tafinlar® **ALTIJD ZONDER voedsel** in. Dit betekent dat je Tafinlar® telkens ten minste **1 uur vóór het eten of 2 uur na het eten** moet innemen.

Slik de capsules **in hun geheel** door, na elkaar. Je mag de capsules **niet openen, fijnmalen** of erop **kauwen**.



Als je een **dosis** Tafinlar® bent **vergeten** te nemen en het duurt nog 6 uur of langer tot je de volgende dosis moet innemen, neem de capsules dan meteen in zodra je eraan denkt. Als **het minder dan 6 uur** duurt tot je je nieuwe dosis moet innemen, sla je de vergeten dosis over. Neem de volgende dosis in volgens het gebruikelijke schema. Neem **geen dubbele dosis** in om een vergeten dosis in te halen. Bij **braken na inname** de dosis niet herhalen, maar de volgende dosis innemen volgens het gebruikelijke schema.



Tijdens een behandeling met Tafinlar® mag je geen **pompelmoes, sterfruit, granaatappel** en producten op basis van **Sint-Janskruid** gebruiken.

Als je tijdens je behandeling met Tafinlar® nog **andere medicatie, kruiden, homeopathische middelen of voedingssupplementen** inneemt of overweegt in te nemen, meld dit dan aan je arts of apotheker. Meld zeker het gebruik van maagbeschermers (Rennie®, Maalox®, Pantomed®, Zantac®, ...) omdat ze de werking van Tafinlar® kunnen beïnvloeden.



Tafinlar® kan de werking van je nieren beïnvloeden zonder dat je hiervan iets merkt en kan ook andere klachten veroorzaken. Daarom zal de arts regelmatig een bloedafname plannen om o.a. de nierfunctie te controleren. Je arts zal ook je huid en gezichtsvermogen controleren en een CT-scan nemen van je borst en buik.



- Als je je moe of zwak voelt door de behandeling met Tafinlar® of als je problemen hebt met je gezichtsvermogen, wees dan bijzonder **voorzichtig** wanneer je een **voertuig bestuurt** of een **machine gebruikt**.

Zoals elk geneesmiddel kunnen ook Tafinlar® nevenwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. Volgende **nevenwerkingen** komen **zeer vaak** voor (bij meer dan 1/10 patiënten):



- ✓ Koorts ($\geq 38^{\circ}\text{C}$), koude rillingen
- ✓ Hoesten
- ✓ Hoofdpijn
- ✓ Algemene zwakte, vermoeidheid
- ✓ Koude rillingen
- ✓ Verminderde eetlust
- ✓ Misselijkheid en braken
- ✓ Diarree
- ✓ Huiduitslag (rash), papilloom (niet kwaadaardige huidtumor)
- ✓ Haaruitval (alopecia)
- ✓ Roodheid, droogheid, blaren op handpalmen en voetzolen
- ✓ Spier- en gewrichtspijn, pijn in handen of voeten



Contacteer het **behandelend team**:

- ✓ Als je veel last ondervindt van bovenvermelde nevenwerkingen
- ✓ Als je te veel van Tafinlar® hebt ingenomen
- ✓ Bij koorts ($\geq 38^{\circ}\text{C}$)
- ✓ Als je last hebt van hartkloppingen of een onregelmatige hartslag, duizelig, moe en kortademig bent en gezwollen enkels en benen hebt
- ✓ Bij een nieuwe wrat, of een wondje in de huid of een roodachtig bultje dat bloedt of niet geneest of op een verandering van een moedervlek in grootte of kleur
- ✓ Als je oogproblemen ervaart (wazig zien, rode en gevoelige ogen, pijn in het oog, gevoelig zijn voor licht, zwevende vlekjes voor de ogen)



Noteer hier je vragen of specifieke bijwerkingen die je wil bespreken tijdens de volgende consultatie.



Contactgegevens ziekenhuis