

Sorafenib (Nexavar®)



Sorafenib wordt gebruikt bij verschillende types kanker, zoals **leverkanker**, progressieve (lokaal gevorderd of uitgezaaid naar andere delen van het lichaam) **schilddklierkanker** en uitgezaaide **nierkanker** wanneer een eerdere therapie niet heeft gewerkt of ongeschikt wordt geacht.



Sorafenib bindt in kankercellen aan specifieke eiwitten, de zogenaamde proteïnekinasen, om zo de werking ervan te blokkeren. Een gevolg hiervan is dat de **kankercellen niet meer** in staat zijn **te groeien** en zich te **vermenigvuldigen**. Sorafenib blokkeert ook de **vorming van bloedvaten rond de tumor** waardoor er **geen zuurstof en voedingsstoffen** naar de tumorcel kunnen gevoerd worden. Een gevolg hiervan is dat de **kankercellen niet meer** in staat zijn om te **groeien** of om zich te **vermenigvuldigen** en daardoor **afsterven**.



Elke tablet bevat 200 mg of 400 mg sorafenib. De aanbevolen **dagelijkse dosis** is **800 mg (2 tabletten van 200mg of 1 tabel van 400 mg, tweemaal per dag)**. Als de nevenwerkingen te zwaar doorwegen kan de arts in overleg met jou de dosis verminderen of kan de behandeling tijdelijk onderbroken worden.



Neem **tweemaal per dag, op een vast tijdstip** de aanbevolen hoeveelheid in met een glas water. Zorg dat er ongeveer 12 uur zit tussen de twee innames.

Dagelijkse dosis: ... mg = ... tabletten sorafenib per keer, tweemaal per dag



Neem sorafenib **met of zonder voedsel** in. Slik de tabletten in hun geheel door met een glas water. Je mag de tabletten niet breken, fijnmalen of erop kauwen.



Als je een **dosis** bent **vergeten**, neem je deze in zodra je eraan denkt. Sla de gemiste dosis echter over als het bijna tijd is voor de volgende dosis. Ga vervolgens verder volgens het gebruikelijke schema. Neem **geen dubbele dosis** om de vergeten tabletten in te halen.



Tijdens een behandeling met sorafenib mag je geen **pompelmoes, sterfruit, granaatappel** en producten op basis van **Sint-Janskruid** gebruiken.

Als je tijdens je behandeling met sorafenib nog **andere medicatie, kruiden, homeopathische middelen of voedingssupplementen** inneemt of overweegt in te nemen, meld dit dan aan je arts of apotheker.



Sorafenib kan je bloeddruk verhogen en andere klachten veroorzaken. Daarom zal de arts regelmatig je bloeddruk meten. Indien je gekende hartproblemen hebt (QT- interval verlenging) zal de arts regelmatig je hartfunctie opvolgen door middel van ECG, alsook elektrolyten in je bloed (magnesium, kalium, calcium) controleren.



Zoals elk geneesmiddel kan ook sorafenib nevenwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. Volgende **nevenwerkingen** komen **zeer vaak** voor (bij meer dan 1/10 patiënten):

- ✓ Hoge bloeddruk
- ✓ Blauwe plekken, bloed ophoesten, bloed in de stoelgang
- ✓ Infecties
- ✓ Koorts ($\geq 38^{\circ}\text{C}$)
- ✓ Misselijkheid, braken en buikpijn
- ✓ Diarree of moeilijke stoelgang (obstipatie)
- ✓ Verminderde eetlust, gewichtsafname
- ✓ Vermoeidheid
- ✓ Hoofdpijn
- ✓ Gewrichtspijn, botpijn
- ✓ Huidproblemen: huiduitslag (rash), jeuk, rode en droge huid
- ✓ Haaruitval (alopecia)
- ✓ Hand-voet huidreactie: roodheid, droogheid, blaren op handpalmen en voetzolen
- ✓ Te laag fosfaatgehalte in bloed (gezien in bloedname)



Contacteer het behandelend team:

- ✓ Als je veel last ondervindt van bovenvermelde nevenwerkingen
- ✓ Als je te veel sorafenib hebt ingenomen
- ✓ Bij allergische reactie: slik- of ademhalingsproblemen, zwelling van lippen, tong, gezicht of bij ernstige jeuk van de huid gepaard met rode uitslag
- ✓ Teken van infectie: koorts ($\geq 38^{\circ}\text{C}$), koude rillingen, hoesten, ademhalingsproblemen of piepende ademhaling
- ✓ Als je kortademigheid, hartkloppingen, een onregelmatige of versnelde hartslag, pijn of druk op de borst ervaart
- ✓ Bij huidproblemen, vooral op handen en voeten (roodheid, eelt, blaren)
- ✓ Als je bloedingen krijgt



Noteer hier je vragen of specifieke bijwerkingen die je wil bespreken tijdens de volgende consultatie.



Contactgegevens ziekenhuis