

Odomzo® (sonidegib)



Odomzo®, met sonidegib als werkzame stof, wordt gebruikt voor de behandeling van een bepaald type huidkanker, **basaalcelcarcinoom** genaamd. Odomzo® wordt gebruikt wanneer de kanker zich verspreid heeft naar gebieden in de buurt (**lokaal uitgebreid**) en je arts besluit dat radiotherapie of chirurgie niet geschikt is.



Odomzo® bindt aan één van de belangrijkste eiwitten die betrokken zijn bij het ontstaan van basaalcelcarcinoom, het zogenaamde 'smoothened' transmembraan-eiwit (SMO), om zo de werking ervan te blokkeren. Een gevolg hiervan is dat de **kankercellen niet meer** in staat zijn om te **groeien** of om zich te **vermenigvuldigen** en **daardoor afsterven**.



Elke capsule Odomzo® bevat 200 mg sonidegib. De aanbevolen **dagelijkse dosis** is **200 mg éénmaal daags**. Als de nevenwerkingen te zwaar doorwegen kan de arts in overleg met jou de dosis verminderen of kan de behandeling tijdelijk onderbroken worden.



Neem de aanbevolen hoeveelheid in **op een vast tijdstip éénmaal per dag** met een half glas water.

Dagelijkse dosis: ... mg = ... capsule Odomzo® 200 mg



Neem Odomzo® **ALTIJD ZONDER voedsel** in. Dit betekent dat je Odomzo® ten minste 1 uur vóór of 2 uur na het eten moet innemen. Slik de capsule **in zijn geheel** door met een half glas water. Je mag de capsule **niet openen, niet fijnmalen** of erop **kauwen**.



Als je een **dosis** bent **vergeten**, neem deze dan in zodra je eraan denkt, tenzij er meer dan 6 uur zijn verstreken sinds de geplande dosis had moeten worden ingenomen. In dat geval sla je de vergeten dosis over en neem je de volgende dosis op het geplande tijdstip. Neem **geen dubbele dosis** om de vergeten capsule in te halen.



Tijdens een behandeling met Odomzo® mag je geen **pompelmoes, granaatappel** of producten op basis van **Sint-Janskruid** gebruiken. Odomzo® kan ook een wisselwerking geven met andere middelen. Als je tijdens je behandeling met Odomzo® nog **andere medicatie, kruiden, homeopathische middelen of voedings-supplementen** inneemt of overweegt in te nemen, meld dit dan aan je arts of apotheker.



Odomzo® kan spierproblemen geven. Daarom zal de arts voorafgaand aan de behandeling een bloedafname doen om de spierwaarden te controleren. Dit zal opnieuw gebeuren indien je spierklachten ervaart. Ook kan dit medicijn een verhoogd risico geven op een ander soort huidkanker dus zal de arts regelmatig jouw huid controleren. Odomzo® heeft mogelijk schadelijke effecten op het ongeboren kind. Daarom moet er bij vruchtbare vrouwen voorafgaand en ook tijdens de behandeling maandelijks onder medisch toezicht een **zwangerschapstest** worden uitgevoerd.



- Tijdens de behandeling met Odomzo® mag je **NIET zwanger zijn of worden**. Vrouwen moeten **effectieve anticonceptie** gebruik tijdens de behandeling en tot 20 maanden erna. Bij mannen is effectieve anticonceptie vereist tijdens de behandeling en tot 6 maanden erna, zelfs na sterilisatie.
- Als je je duizelig, zwak of vermoeid voelt door de behandeling met Odomzo®, wees dan bijzonder **voorzichtig** wanneer je een **voertuig bestuurt** of een **machine gebruikt**.
- Tijdens je behandeling en respectievelijk tot 6 en 20 maanden erna mag je **geen sperma en bloed doneren**.



Zoals elk geneesmiddel kan ook Odomzo® nevenwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. Volgende **nevenwerkingen** komen **zeer vaak** voor (bij meer dan 1/10 patiënten):

- | | |
|---|---|
| ✓ Spierspasmen, spierpijn, gewrichtspijn | ✓ Buikpijn |
| ✓ Haaruitval (alopecia), jeuk | ✓ Hoofdpijn |
| ✓ Abnormale smaak in de mond, verminderde eetlust | ✓ Lever- en pancreasproblemen (gezien in bloedafname) |
| ✓ Vermoeidheid | ✓ Wegblijven van de menstruatie (amenorroe) |
| ✓ Gewichtsverlies | ✓ Verhoging van bloedglucose-spiegel |
| ✓ Misselijkheid en braken | |
| ✓ Diarree of moeilijke stoelgang (obstipatie) | |



Contacteer het behandelend team:

- ✓ Als je veel last ondervindt van bovenvermelde nevenwerkingen
- ✓ Als je te veel van Odomzo® hebt ingenomen
- ✓ Als tijdens de behandeling of tot 20 maanden erna je denkt dat de anticonceptie om eender welke reden niet heeft gewerkt, je menstruatie stopt, je bent gestopt met het gebruik van anticonceptie of je van anticonceptie moet veranderen
- ✓ Bij spierpijn of onverklaarbare spierkrampen en/of -zwakte
- ✓ Bij slik- of ademhalingsproblemen, zwelling van lippen, tong, gezicht of bij ernstige jeuk van de huid gepaard met rode huiduitslag
- ✓ Bij ernstig of aanhoudend braken of diarree



Noteer hier je vragen of specifieke bijwerkingen die je wil bespreken tijdens de volgende consultatie.



Contactgegevens ziekenhuis