

Abemaciclib (Verzenios®)



Verzenios®, met abemaciclib als werkzame stof, wordt gebruikt als **adjuvante (of aanvullende) behandeling** van HR-positieve, HER2-negatieve, klierpositieve **vroege borstkanker** met een **hoog risico op hervallen**. Verzenios® wordt gecombineerd met een oestrogeenverlagend geneesmiddel.

Verzenios®, wordt gebruikt voor de behandeling van **gevorderde of naar andere delen van het lichaam uitgezaaide (gemetastaseerde) borstkanker** van een type dat wordt aangeduid met hormoonreceptor(HR)-positieve, humane epidermale groeifactorreceptor 2(HER2)-negatieve borstkanker.



Abemaciclib remt in kankercellen specifieke eiwitten, de zogenaamde cyclineafhankelijke kinasen 4 en 6, die belangrijk zijn voor de groei en deling van cellen. Deze eiwitten zijn bij sommige kankercellen abnormaal actief waardoor de cellen ongecontroleerd gaan groeien. Abemaciclib remt deze eiwitten. Een gevolg hiervan is dat de **kankercellen niet meer** in staat zijn om te **groeien** of om zich te **vermenigvuldigen** en daardoor **afsterven**.



Er bestaan 3 soorten tabletten: tabletten met 50 mg, 100 mg en 150 mg abemaciclib. De aanbevolen **dagelijkse dosis is 150 mg tweemaal per dag**. Als de nevenwerkingen te zwaar doorwegen kan de arts in overleg met jou de dosis verminderen of kan de behandeling tijdelijk onderbroken worden.



Neem **tweemaal per dag, op vaste tijdstippen** de aanbevolen hoeveelheid in met een glas water. Zorg dat er ongeveer 12 uur zit tussen de twee innames.

Dagelijkse dosis: ... mg = ... tabletten abemaciclib ... mg per keer, tweemaal per dag



Neem abemaciclib **met of zonder voedsel** in. Slik de tabletten in hun geheel door met een glas water. Je mag de tabletten **niet breken, fijnmalen of erop kauwen**.



Als je een **dosis bent vergeten**, hoeft je deze **niet in te halen**, maar neem je gewoon de volgende dosis op het gebruikelijke tijdstip. Neem **geen dubbele dosis** om de vergeten tabletten in te halen. Bij **braken na inname** de dosis niet herhalen, maar de volgende dosis innemen volgens het gebruikelijke schema.



Tijdens de behandeling met abemaciclib mag je **geen pompelmoes, sterfruit, granaatappel** of producten op basis van **Sint-Janskruid** gebruiken.

Als je tijdens je behandeling nog **andere medicatie, kruiden, homeopathische middelen of voedingssupplementen** inneemt of overweegt in te nemen, meld dit dan aan je arts of apotheker.



Abemaciclib kan leverstoornissen veroorzaken en de samenstelling van je bloed verstoren. Daarom zal de arts regelmatig een bloedafname plannen om o.a. de leverfunctie en het aantal bloedcellen te controleren.



- Tijdens je behandeling met abemaciclib moet je bijzonder **voorzichtig** zijn wanneer je een **voertuig bestuurt** of een **machine gebruikt**. Een behandeling met abemaciclib kan namelijk vermoeidheid of duizeligheid veroorzaken.
- **Zwangerschap en borstvoeding:** speciale voorzorgen zijn nodig, spreek erover met uw arts of apotheker.

Zoals elk geneesmiddel kan ook abemaciclib nevenwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. Volgende **nevenwerkingen** komen **zeer vaak** voor (bij meer dan 1/10 patiënten):



- ✓ Diarree (vooral tijdens de eerste maand van de behandeling) (bij 8/10 patiënten)
- ✓ Misselijkheid (4/10), eventueel met braken (2/10)
- ✓ Verminderd aantal rode bloedcellen (anemie), witte bloedcellen (leukopenie, neutropenie) en bloedplaatjes (trombocytopenie) (3/10)
- ✓ Vermoeidheid, algemene lichamszwakte (3/10)
- ✓ Verhoogd risico op infecties (3/10)
- ✓ Verminderde eetlust (anorexie) (2/10)
- ✓ Haarverdunning (alopecia) (2/10)
- ✓ Hoofdpijn (2/10)
- ✓ Verhoogd risico op bloedingen (1/10)
- ✓ Koorts (1/10)
- ✓ Duizeligheid (1/10)
- ✓ Abnormale smaak in de mond (dysgeusie) (1/10)
- ✓ Huiduitslag (rash), jeuk (1/10)
- ✓ Leverproblemen (gezien in bloedafname) (1/10)

Contacteer het behandelend team:

- ✓ Bij ernstige of aanhoudende diarree
- ✓ Als je te veel last ondervindt van bovenvermelde nevenwerkingen
- ✓ Als je te veel abemaciclib hebt ingenomen
- ✓ Bij pijn op de borst, een pijnlijk en opgezwollen benen, kortademigheid, een snelle ademhaling of versnelde hartslag
- ✓ Bij tekenen van infectie: koorts ($\geq 38^{\circ}\text{C}$), koude rillingen, hoesten, ademhalingsproblemen of een piepende ademhaling,



Contactgegevens ziekenhuis



Patiëntidentificatie

Abemaciclib – doseringsschema

(Verzenios® en generieken)

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Cyclus van .../.../.... tot .../.../....	Abemaciclib ... mg ☀	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Abemaciclib ... mg 🌙	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Loperamide 2 mg																												

Abemaciclib ... mg => 1 tablet van ... mg per inname

Loperamide 2 mg => vul het aantal capsules of tabletten van 2 mg in die u die dag heeft ingenomen



Noteer hier je vragen of specifieke bijwerkingen die je wil bespreken tijdens de volgende consultatie.