



## R-POLA-mini-CHP (Rituximab + Polatuzumab vedotine + Cyclofosfamide + Doxorubicine)

Je arts heeft **R-POLA-CHP** voorgeschreven als onderdeel van je behandeling. Deze therapie bestaat uit een combinatie van chemotherapie en doelgerichte therapie. We geven je in deze infofiche graag meer uitleg over de werking, het verloop en mogelijke bijwerkingen van je behandeling.

### Hoe werkt mijn behandeling?



**Chemotherapie:** Je krijgt geneesmiddelen toegediend die de **celdeling afremmen** en zo vooral snel delende cellen, zoals **kankercellen, beschadigen**. Deze geneesmiddelen worden ook cytostatica of celremmende geneesmiddelen genoemd. Bij deze behandeling gebruiken we volgende cytostatica: cyclofosfamide en doxorubicine.



**Doelgerichte therapie:** Je krijgt een geneesmiddel toegediend dat **doelgericht op zoek gaat naar bepaalde cellen** in het lichaam.

Rituximab is specifiek gericht **tegen het CD20 eiwit** dat aanwezig is **op de B-cellen**. Op deze manier kan het doelbewust de groei en verspreiding van dit type cellen tegengaan. De binding van rituximab zorgt ervoor dat de B-cellen gedood worden. Bovendien zal deze binding jouw eigen immuunsysteem ook aansporen om de B-cellen aan te vallen en op te ruimen.



**Tweedelige therapie (doelgericht + chemotherapie):** Dit geneesmiddel bestaat uit twee delen die aan elkaar verbonden zijn. Hierbij wordt er een 'chemo-deel' (vedotine) gekoppeld aan een 'doelgericht deel' (polatuzumab) waardoor deze chemotherapie specifiek kan inwerken op de kankercellen dan klassieke chemotherapie.

Polatuzumab gaat doelgericht binden op het **CD79b eiwit**. Dit is een eiwit dat aanwezig is op de **B-cellen**. Door deze binding kan het geneesmiddel deze B-cellen binnendringen. Hierna zal het 'chemo-deel' vrijgegeven worden in de cel en kan dit zijn werking uitvoeren. Op deze manier wordt de celdeling van deze B-cellen specifiek afgeremd en zullen de kankercellen sterven.

### Hoe verloopt mijn behandeling?

- Jouw **eerste behandeling** wordt toegediend op de **verpleegafdeling** van de dienst hematologie. Je verblijft dan één nacht in het ziekenhuis ter observatie.
- De **volgende behandelingen** worden toegediend in het **dagziekenhuis** van de dienst hematologie.
- Je afspraak verloopt als volgt:



- Je behandeling wordt toegediend in periodes, die **cycli** worden genoemd. **Een cyclus duurt 21 dagen**. In de meeste gevallen worden er 6 cycli gegeven, maar het totaal aantal cycli wordt steeds individueel bepaald door jouw arts op basis van het stadium van uitbreidheid van de ziekte.
- Op de volgende pagina geven we je een overzicht van je **behandelschema**. Dit is een standaardschema. De behandeltime en ondersteunende medicatie kan individueel wijzigen.

| Cyclus 1     | Geneesmiddel         | Dag 1                                                                               | Dag 2                                                                               | Dag 3                                                                               | Dag 4                                                                               | Dag 5                                                                               | Dag 6-21 | Ter info                                                                                                                                                          |
|--------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | Akynzeo 300mg+0.5mg  |    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |          | Voorkomen van misselijkheid<br>Inname minstens 1 uur voor de chemotherapie                                                                                        |
|              | Prednisolone 60mg    |    |    |    |    |    |          | Voorkomen van allergische reactie en verminderen van nevenwerkingen<br>Cortisone vermindert ook het volume van de tumor<br>Inname minstens 1 uur voor de therapie |
|              | Dafalgan 1g          |    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |          | Tegen koorts en rillen<br>Inname minstens 1 uur voor de therapie                                                                                                  |
|              | Cetirizine 10mg      |    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |          | Voorkomen van allergische reacties<br>Inname minstens 1 uur voor de therapie                                                                                      |
|              | Spoelvloeistof       |    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |          | Traag inlopend waakinfuus                                                                                                                                         |
|              | Cyclofosfamide       |    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |          | <b>Therapie</b><br>Intraveneuze toediening over 15 minuten                                                                                                        |
|              | Doxorubicine         |    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |          | <b>Therapie</b><br>Snelle intraveneuze toediening                                                                                                                 |
|              | Rituximab            |    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |          | <b>Therapie</b><br>Intraveneuze toediening volgens opklimschema                                                                                                   |
|              | Polatuzumab vedotine |    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |          | <b>Therapie</b><br>Intraveneuze toediening over 90 minuten                                                                                                        |
|              | Spoelvloeistof       |    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |          | Naspoelen van de leidingen                                                                                                                                        |
|              | G-CSF                |                                                                                     |  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |          | Groefactoren<br>Toedienen na beëindiging chemotherapie                                                                                                            |
| Cyclus 2 - 6 | Geneesmiddel         | Dag 1                                                                               | Dag 2                                                                               | Dag 3                                                                               | Dag 4                                                                               | Dag 5                                                                               | Dag 6-21 | Ter info                                                                                                                                                          |
|              | Akynzeo 300mg+0.5mg  |  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |          | Voorkomen van misselijkheid<br>Inname minstens 1 uur voor de chemotherapie                                                                                        |
|              | Prednisolone 60mg    |  |  |  |  |  |          | Voorkomen van allergische reactie en verminderen van nevenwerkingen<br>Cortisone vermindert ook het volume van de tumor<br>Inname minstens 1 uur voor de therapie |
|              | Dafalgan 1g          |  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |          | Tegen koorts en rillen<br>Inname minstens 1 uur voor de therapie                                                                                                  |
|              | Cetirizine 10mg      |  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |          | Voorkomen van allergische reacties<br>Inname minstens 1 uur voor de therapie                                                                                      |
|              | Spoelvloeistof       |  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |          | Traag inlopend waakinfuus                                                                                                                                         |
|              | Cyclofosfamide       |  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |          | <b>Therapie</b><br>Intraveneuze toediening over 15 minuten                                                                                                        |
|              | Doxorubicine         |  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |          | <b>Therapie</b><br>Snelle intraveneuze toediening                                                                                                                 |
|              | Polatuzumab vedotine |  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |          | <b>Therapie</b><br>Intraveneuze toediening over 30 minuten                                                                                                        |
|              | Spoelvloeistof       |  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |          | Naspoelen van de leidingen                                                                                                                                        |
|              | Rituximab            |  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |          | <b>Therapie</b><br>Dit wordt vanaf de 2 <sup>e</sup> cyclus meestal als een trage subcutane inspuiting in de buik gegeven                                         |
|              | G-CSF                |                                                                                     |  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |          | Groefactoren<br>Toedienen na beëindiging chemotherapie                                                                                                            |

## Wat zijn mogelijke bijwerkingen van mijn behandeling?

Elke behandeling kan bijwerkingen veroorzaken. De ernst van de bijwerkingen is **afhankelijk van de gebruikte producten** en kan **individueel** verschillen. Volgende bijwerkingen zijn specifiek voor je behandeling:

- Minder witte bloedcellen: verhoogd risico op infecties
- Minder rode bloedcellen: vermoeidheid
- Minder bloedplaatjes: risico op bloedingen
- Verminder kalium in het bloed
- Misselijkheid en braken
- Buikpijn
- Smaak- en reukveranderingen
- Ontstoken mondslijmvlies en droge mond
- Constipatie of diarree
- Haarverlies
- Huiduitslag
- Tintelingen of voos gevoel in de vingers/tenen
- Afwijkingen aan de lever
- Slechtere wondgenezing
- Gevoeligheid voor zonlicht
- Stemmingsstoornissen
- Irritatie van de blaas
- Overgevoelighedsreacties
- Verminderde opbrengst van antistoffen na vaccinaties

## Aandachtspunten bij je behandeling:

- Het is belangrijk om te vermelden **welke andere geneesmiddelen** je neemt (ook als het gaat over voedingssupplementen, homeopathische middelen of vitaminen), want die kunnen mogelijk de werking van je behandeling beïnvloeden. Gelieve een overzicht van je thuismedicatie mee te nemen en te bespreken tijdens je volgende consultatie.
- We raden je aan om na je behandeling voldoende **water te drinken**.
- Bij chemotherapie worden er schadelijke producten via de **urine en stoelgang** afgescheiden. Dit kan tot 7 dagen na de behandeling. Tijdens deze periode neem je best voorzorgmaatregelen om contaminatie te vermijden. Daarom raden we aan om zittend te plassen en steeds twee maal het toilet door te spoelen met een gesloten deksel.
- Doxorubicine kan een **rode verkleuring** van de urine en soms ook het traanvocht geven. Dit is volkomen onschuldig en verdwijnt spontaan.
- Wanneer bepaalde geneesmiddelen onbedoeld buiten het bloedvat terechtkomen (ook '**extravasatie**' genoemd), kan het weefselschade veroorzaken. Bijgevolg zal er tijdens de toediening van doxorubicine een verpleegkundige bij jou in de buurt blijven ter controle van het correct inlopen. Merk je pijn en/of een zichtbare zwelling op tijdens een toediening? Waarschuw dan onmiddellijk je behandelend team.
- Een **overgevoelighedsreactie** kan optreden tijdens het toedienen van rituximab en polatuzumab vedotine. Er wordt steeds medicatie voorzien (zie schema) ter preventie van deze reactie. Als bijkomende maatregel dienen we deze geneesmiddelen bij de 1<sup>e</sup> toediening ook aan een tragere snelheid toe. Bij **rituximab** starten we aan een heel trage snelheid, waarna de toediensnelheid om de 30 minuten verhoogd wordt. Vanaf de 2<sup>e</sup> cyclus wordt rituximab meestal als een subcutane inspuiting gegeven. Bij **polatuzumab vedotine** wordt het infuus de eerste keer over 90 minuten gegeven. Als alles goed verloopt, wordt dit vanaf de 2<sup>e</sup> cyclus over 30 minuten toegediend. Tijdens het inlopen worden jouw parameters ook continu gemonitord. Merk je zelf toch een reactie tijdens jouw behandeling? Waarschuw dan onmiddellijk je behandelend team.
- Chemotherapie valt alle snel delende cellen aan, waaronder ook de witte bloedcellen. Om deze daling snel te kunnen recupereren, geven we **groeifactoren**. Dit zal de aanmaak van witte bloedcellen in het lichaam stimuleren zodat het aantal weer stijgt. De toediening gebeurt via een onderhuidse inspuiting in de buik, een bovenarm of het bovenbeen. Het kan zijn dat je deze spuit mee naar huis krijgt voor toediening 24 uur na het beëindigen van de chemo. Je kan dit zelf toedienen of door een thuisverpleegkundige laten doen. Schudden moet ten alle tijden voorkomen worden aangezien dit het product kan beschadigen.
- Tijdens de behandeling neem je gedurende **5 dagen cortisone capsules** (prednisolone). Cortisone is een belangrijk onderdeel van de behandeling, maar kan ook nevenwerkingen geven. Gekende nevenwerkingen zijn: onregelde bloedsuiker, verhoogde bloeddruk, opgejaagd gevoel, slapeloosheid, warmteopwellingen, vochtophoping en maaglast. Op de dagen van therapie neem je dit 1 uur voor het starten van de therapie. De overige dagen neem je dit best 's ochtends, bij het ontbijt. Op deze manier volgen we het natuurlijk verloop van jouw eigen cortisolaanmaak in het lichaam en proberen we de nevenwerkingen tot het minimum te beperken.

**Contacteer je behandelend team als een van de volgende problemen optreedt:**

- Koorts van 38°C of hoger en/of koude rillingen. Chemotherapie veroorzaakt een daling van de witte bloedcellen waardoor je vatbaarder en minder weerbaar bent tegen infecties. Bij koorts (38°C of hoger) of koude rillingen is contact met het behandelteam aangewezen. Zo kan er een bloedafname en nazicht in het ziekenhuis gebeuren.
- Meer dan 24 uur hevig braken
- Meer dan 48 uur diarree
- Plots optredende en/of frequente bloedingen of blauwe plekken
- Ongewone hoofdpijn
- Extreme vermoeidheid of kortademigheid
- Pijnlijke mond of keel
- Branderig gevoel als je plast
- Bloed in je urine

**Contactgegevens Hematologie**

| Hematologie      | <input type="checkbox"/> ZAS Augustinus | <input type="checkbox"/> ZAS Cadix | <input type="checkbox"/> ZAS Palfijn |
|------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Dagziekenhuis    | 03 443 47 11                            | 03 339 74 58                       | 03 640 28 02                         |
| Verpleegafdeling | 03 443 35 11                            | 03 339 71 10                       |                                      |
| Centraal nummer  | 03 443 30 11                            | 03 217 71 11                       | 03 640 21 11                         |
| Spoed            | 03 443 39 00                            | 03 339 71 00                       | 03 640 20 00                         |

ZAS vzw • Kempenstraat 100, 2030 Antwerpen • BE 0862.382.656 • RPR Antwerpen  
Erkenningsnummer 7/10009/31/000: ZAS Cadix, ZAS Elisabeth, ZAS Erasmus, ZAS Hoge Beuken, ZAS Joostens, ZAS Middelheim, ZAS Palfijn, ZAS Paola, ZAS Polikliniek Regatta, ZAS UKJA • Erkenningsnummer 7/10099/38/000: ZAS Augustinus, ZAS Polikliniek Hof ter Schelde, ZAS Sint-Jozef, ZAS Vincentius • Erkenningsnummer 7/20998/03/000: ZAS PZ Stuivenberg • Erkenningsnummer 7/25047/28/000: ZAS PVT Antwerpen