



Doxorubicine (peg/lip) (Caelyx®)

Je arts heeft **Doxorubicine (liposomaal gepegyleerd) (Caelyx®)** voorgeschreven als onderdeel van je behandeling. We geven je in deze infofiche graag meer uitleg over de werking, het verloop en mogelijke bijwerkingen van je behandeling.

Hoe werkt mijn behandeling?



Chemotherapie: Je krijgt 1 geneesmiddel, **Doxorubicine (liposomaal gepegyleerd)**, toegediend dat de **celdeling afremt** en zo vooral sneldelevende cellen, zoals **kankercellen, beschadigt**. Dit geneesmiddel wordt ook een cytostaticum of celremmend geneesmiddelen genoemd.

Hoe verloopt mijn behandeling?

- Je behandeling wordt toegediend in het **dagziekenhuis van het Oncologisch Centrum Antwerpen**
- Je afspraak verloopt als volgt:



- Je behandeling wordt toegediend in periodes, die **cycli** worden genoemd. **1 cyclus duurt 28 dagen met 1 toediening per cyclus**. Het totaal aantal cycli wordt bepaald door je arts.
- Hieronder geven we je een overzicht van je behandelingschema.

Cyclus van 28 dagen	Geneesmiddel	Dag 1	Dag 2-28	Ter info
	Spoelvlloeistof			Voorspoeling
	Dexamethasone 8mg			Tegen allergische reacties en misselijkheid en braken. Inname 30 minuten voor start van chemo.
	Doxorubicine (peg/lip) (Caelyx®)			Chemo Eerste toediening: 2 uur via infuus Vanaf tweede toediening: 1 uur via infuus
	Spoelvlloeistof			10 minuten spoelen van infuusleiding. Nadien verwijderen van infuus.

Dit is een standaardschema. De behandel tijd en ondersteunde medicatie kan individueel wijzigen.

Wat zijn mogelijke bijwerkingen van mijn behandeling?

Elke behandeling kan bijwerkingen veroorzaken. De ernst van de bijwerkingen is afhankelijk van de gebruikte producten en kan individueel verschillen. Meer informatie over bijwerkingen en preventieve maatregelen vind je terug in de brochure 'Gids bij je kankerbehandeling met medicijnen'. Volgende bijwerkingen zijn specifiek voor je behandeling:

- Ontstoken mondslijmvlies en droge mond
- Huidveranderingen
- Hand-voetsyndroom
- Minder witte bloedcellen: verhoogde vatbaarheid voor infecties
- Minder rode bloedcellen
- Minder bloedplaatjes
- Ongewone vermoeidheid
- Misselijkheid en braken
- Zeer weinig haarverlies

Aandachtspunten bij je behandeling:

- Het is belangrijk om te vermelden **welke andere geneesmiddelen** je neemt (ook als het gaat over voedingssupplementen, homeopathische middelen of vitaminen), want die kunnen mogelijk de werking van je behandeling beïnvloeden. Gelieve een overzicht van je thuismedicatie mee te nemen en te bespreken tijdens je volgende consultatie.
- **Doxorubicine (peg/lip)** kan een **rode verkleuring van de urine** (en soms ook het traanvocht) geven. Dit is volkomen onschuldig en verdwijnt spontaan. We raden je aan om na je behandeling voldoende water te drinken.
- Een **overgevoeligsreactie** kan optreden tijdens het toedienen van **Doxorubicine (peg/lip)**. Ter preventie wordt steeds een voorbehandeling met dexamethasone voorzien. Het eerste infuus wordt aan een tragere snelheid gegeven (over 2 uur), indien goed verdragen kan vanaf de tweede toediening het infuus over 1 uur gegeven worden. Mogelijke symptomen van een overgevoeligsreactie zijn huiduitslag, roodheid van het gelaat, een gevoel van benauwdheid, snelle hartslag, lage bloeddruk, koorts of rillingen.. Merk je toch één van deze symptomen tijdens je behandeling? Waarschuw dan onmiddellijk je behandelend team.
- **Doxorubicine (peg/lip)**: Als dit geneesmiddel onbedoeld buiten het bloedvat terechtkomt (ook 'extravasatie' genoemd), kan het weefselschade veroorzaken. Merk je pijn en/of een zichtbare zwelling op tijdens de toediening? Waarschuw dan onmiddellijk je behandelend team.



Contacteer je behandelend team als een van de volgende problemen optreedt:

Koorts van 38°C of hoger of koude rillingen. Chemotherapie veroorzaakt een daling van de witte bloedcellen waardoor je vatbaarder en minder weerbaar bent tegen infecties. Bij koorts (temperatuur van 38°C of hoger) of koude rillingen is contact met het behandelteam aangewezen om een bloedname en nazicht in het ziekenhuis te organiseren.

Contactgegevens Oncologisch Centrum Antwerpen

Oncologisch centrum Antwerpen	☐ ZAS Augustinus	☐ ZAS Middelheim	☐ ZAS Palfijn
Dagziekenhuis	03 443 36 69	03 280 40 12	03 640 28 02
Verpleegafdeling	03 443 35 12	03 280 34 72	03 640 25 61
Consultatie	03 443 37 37	03 280 34 03	03 640 28 13
Centraal nummer	03 443 30 11	03 280 31 11	03 640 21 11
Spoed	03 443 39 00	03 280 22 13	03 640 20 00