

# Rapydan® aanbrengen bij kinderen

Informatie voor ouders



## Wat is Rapydan®?

Rapydan® is een geneesmiddel dat lokaal wordt aangebracht op de huid om de huid plaatselijk te verdoven. Deze ‘toverzalf’ wordt gebruikt om pijn, veroorzaakt door pijnlijke procedures (bijvoorbeeld bloedafname, inspuiting...), te voorkomen.

Op die manier zorgen we ervoor dat:

- je kind op het moment zelf minder pijn heeft
- je kind minder angstig zal zijn bij een eventuele volgende prik

Rapydan® is een kant-en-klare pleister die makkelijk kan aangebracht worden.

Met een **voorschrift** van de arts kan je Rapydan® afhalen bij de apotheek.

## Wanneer Rapydan® aanbrengen?

- Voor een optimale werking moet Rapydan® 30 minuten vóór de pijnlijke interventie aangebracht worden. Hou hier rekening mee.
- De Rapydan® pleister mag NIET gebruikt worden bij kinderen jonger dan 3 jaar
- Maximaal 2 pleisters per keer of per dag aanbrengen!
- De huid blijft ook na het verwijderen van de Rapydan® pleister nog één tot twee uur verdoofd.

## Hoe Rapydan®-pleister aanbrengen?

- Zorg ervoor dat de huid zuiver en droog is.
- Haal de pleister uit de verpakking en verwijder het plastic plaatje van de plakrand.
- De pleister moet meteen gebruikt worden na het openen van de verpakking, want de pleister verwarmt vanaf blootstelling aan de lucht.
- Breng de witte zone aan op de te verdoven zone.
- Druk de randen van de pleister goed aan.
- Druk ook voorzichtig op het midden van de pleister, zodat de werkzame stoffen contact maken met de huid.
- In contact met de lucht warmt de pleister op. Breng je kind hiervan op de hoogte (bv. de warmte geeft aan dat de toverzalf extra goed werkt!)
- Dek de pleister NIET af. De zes gaatjes moeten in contact zijn met de buitenlucht zodat verwarming kan optreden.
- Noteer het tijdstip van aanbrengen op de pleister.
- Wacht minimaal **30 minuten** voordat u de pleister verwijdert, respecteer deze applicatietijd.



## Waar Rapydan® aanbrengen?

De arts of verpleegkundige zal je vertellen waar je Rapydan® moet aanbrengen:

### **Handrug en/of elleboogplooi:**

- >  handrug:                       links                       rechts
- >  elleboogplooi:               links                       rechts

**Andere plaats op het lichaam:**  namelijk.....

## Mogelijke bijwerkingen

- Een lichte reactie zoals bleekheid, roodheid, zwelling en jeuk kan zich voordoen op de plaats waar Rapydan® werd aangebracht. Deze reacties zijn gewoonlijk licht en verdwijnen ongeveer tien minuten na het verwijderen van de pleister.

### Opmerkingen

- Rapydan® mag enkel op een intacte huid worden aangebracht. Verwittig vooraf de arts als je kind eczeem heeft.
- Om verwonding van de gevoelloze huid te vermijden: het kind niet laten krabben of wrijven ter hoogte van de verdoofde plaats.
- Vouw de gebruikte pleister met de plaklaag naar binnen en gooi deze veilig weg zodat kinderen niet bij de pleister kunnen komen.

## ZNA Pijnteam Pediatrie

- › dr. Johan Berghmans, anesthesist
- › dr. Frank Opsomer, anesthesist
- › **03 280 49 58** Muriel De Vel,  
ZNA Pijnverpleegkundige pediatrie,



