



Folfox

Je arts heeft **Folfox** voorgeschreven als onderdeel van je behandeling. Deze behandeling bestaat uit drie onderdelen: Oxaliplatine (infuus), 5-FU (infuus) en 5-FU (pomp voor toediening thuis). We geven je in deze infofiche graag meer uitleg over de werking, het verloop en mogelijke bijwerkingen van je behandeling.

Hoe werkt mijn behandeling?



Chemotherapie: Je krijgt 2 geneesmiddelen, **Oxaliplatine en 5-FU** (in infuus en pomp), toegediend die de **celdeling afremmen** en zo vooral sneldelevende cellen, zoals **kankercellen, beschadigen**. Deze geneesmiddelen worden ook cytostatica of celremmende geneesmiddelen genoemd. 5-FU wordt in het infuus gecombineerd met levofolinezuur, een vitamine dat de werking van 5-FU bevordert.

Hoe verloopt mijn behandeling?

- Je behandeling wordt toegediend in het **dagziekenhuis van het Oncologisch Centrum Antwerpen**
- Je afspraak verloopt als volgt:



- Je behandeling wordt toegediend in periodes, die **cycli** worden genoemd. **1 cyclus duurt 14 dagen met 1 toediening per cyclus**. Het totaal aantal cycli wordt bepaald door je arts.
- Hieronder geven we je een overzicht van je behandelingschema.

Cyclus van 14 dagen	Geneesmiddel	Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4-14	Ter info
	Spoelvloeistof					Voorspoeling
	Palonosetron 250µg/5ml					Tegen misselijkheid en braken. Toediening 30 minuten voor start chemo.
	Methylprednisolon 40mg					Tegen misselijkheid en braken. Toediening 30 minuten voor start chemo.
	Oxaliplatine					Chemo Loopt gedurende 2 uur via infuus.
	Spoelvloeistof					10 minuten spoelen van infuusleiding.
	5-FU + levofolinezuur					Chemo Loopt gedurende 15 minuten via infuus.
	Spoelvloeistof					10 minuten spoelen van infuusleiding.
	5-FU pomp			Pomp thuis laten afkoppelen		Chemo Elastomeerpomp loopt gedurende 44 uur. Laten afkoppelen op dag 3 na 14u.

Dit is een standaardschema. De behandel tijd en ondersteunde medicatie kan individueel wijzigen.

Wat zijn mogelijke bijwerkingen van mijn behandeling?

Elke behandeling kan bijwerkingen veroorzaken. De ernst van de bijwerkingen is afhankelijk van de gebruikte producten en kan individueel verschillen. Meer informatie over bijwerkingen en preventieve maatregelen vind je terug in de brochure 'Gids bij je kankerbehandeling met medicijnen'. Volgende bijwerkingen zijn specifiek voor je behandeling:

- Misselijkheid en braken
- Diarree en constipatie
- Tintelingen of voos gevoel in vingers/tenen (vooral uitgelokt door koude)
- Minder witte bloedcellen: verhoogde vatbaarheid voor infecties
- Minder rode bloedcellen (bloedarmoede)
- Ontstoken mondslijmvlies en droge mond
- Geen haarverlies, soms groeivertraging van het haar
- Ongewone vermoeidheid
- Minder bloedplaatjes

Aandachtspunten bij je behandeling:

- Het is belangrijk om te vermelden **welke andere geneesmiddelen** je neemt (ook als het gaat over voedingssupplementen, homeopathische middelen of vitaminen), want die kunnen mogelijk de werking van je behandeling beïnvloeden. Gelieve een overzicht van je thuismedicatie mee te nemen en te bespreken tijdens je volgende consultatie.
- **Oxaliplatine** kan **tintelingen** geven in vingers en/of tenen, die meestal uitgelokt worden door koude. Meestal duurt dit slechts enkele dagen en gaat dit over, doch naarmate je meer behandelingen krijgt, kunnen die soms erger worden. Het is dan ook best om contact met ijskoude zaken, rechtstreeks uit de frigo of diepvriezer, wat te vermijden of eventueel jezelf te beschermen met gebruik van een handschoen. Ook het drinken van ijskoude dranken, vermijdt je best, aangezien dit een onaangename prikkeling in de keel kan veroorzaken.



Contacteer je behandelend team als een van de volgende problemen optreedt:

- Koorts van 38°C of hoger of koude rillingen. Chemotherapie veroorzaakt een daling van de witte bloedcellen waardoor je vatbaarder en minder weerbaar bent tegen infecties. Bij koorts (temperatuur van 38°C of hoger) of koude rillingen is contact met het behandelteam aangewezen om een bloedname en nazicht in het ziekenhuis te organiseren.
- Meer dan 48 uren diarree
- Meer dan 24 uren hevig braken
- Pijnlijke mond of keel

Contactgegevens Oncologisch Centrum Antwerpen

Oncologisch centrum Antwerpen	☐ ZAS Augustinus	☐ ZAS Middelheim	☐ ZAS Palfijn
Dagziekenhuis	03 443 36 69	03 280 40 12	03 640 28 02
Verpleegafdeling	03 443 35 12	03 280 34 72	03 640 25 61
Consultatie	03 443 37 37	03 280 34 03	03 640 28 13
Centraal nummer	03 443 30 11	03 280 31 11	03 640 21 11
Spoed	03 443 39 00	03 280 22 13	03 640 20 00