



## Paclitaxel (Taxol®)

Je arts heeft **Paclitaxel (Taxol®)** voorgeschreven als onderdeel van je behandeling. We geven je in deze infofiche graag meer uitleg over de werking, het verloop en mogelijke bijwerkingen van je behandeling.

### Hoe werkt mijn behandeling?



**Chemotherapie:** Je krijgt 1 geneesmiddel, **Paclitaxel**, toegediend dat de **celdeling afremt** en zo vooral sneldividende cellen, zoals **kankercellen, beschadigt**. Dit geneesmiddel wordt ook een cytostaticum of celremmend geneesmiddelen genoemd

### Hoe verloopt mijn behandeling?

- Je behandeling wordt toegediend in het **dagziekenhuis van het Oncologisch Centrum Antwerpen**
- Je afspraak verloopt als volgt:



- Je behandeling wordt toegediend in periodes, die **cycli** worden genoemd. **1 cyclus duurt 7 dagen met 1 toediening per cyclus**. Het totaal aantal cycli wordt bepaald door je arts.
- Hieronder geven we je een overzicht van je behandelingschema.

Cyclus van  
7 dagen

| Geneesmiddel               | Dag 1 | Dag 2-7 | Ter info                                                                                      |
|----------------------------|-------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Spoelvloeistof             |       |         | Voorspoeling                                                                                  |
| Dexamethasone 8mg          |       |         | Tegen allergische reacties en misselijkheid en braken.<br>Inname 30 minuten voor start chemo. |
| Cetirizine 10mg            |       |         | Tegen allergische reacties.<br>Inname 30 minuten voor start chemo.                            |
| <b>Paclitaxel (Taxol®)</b> |       |         | <b>Chemo</b><br>Loopt gedurende 1 uur via infuus.                                             |
| Spoelvloeistof             |       |         | 15 minuten spoelen van infuusleiding. Nadien verwijderen van infuus.                          |

*Dit is een standaardschema. De behandelingsduur en ondersteunde medicatie kan individueel wijzigen.*

## Wat zijn mogelijke bijwerkingen van mijn behandeling?

Elke behandeling kan bijwerkingen veroorzaken. De ernst van de bijwerkingen is afhankelijk van de gebruikte producten en kan individueel verschillen. Meer informatie over bijwerkingen en preventieve maatregelen vind je terug in de brochure 'Gids bij je kankerbehandeling met medicijnen'. Volgende bijwerkingen zijn specifiek voor je behandeling:

- Haarverlies
- Tintelingen of voos gevoel in vingers/tenen
- Nagelveranderingen
- Allergische of overgevoeligheidsreacties
- Ongewone vermoeidheid
- Irritatie van slijmvliezen van ogen (bv. tranende ogen) en neus (bv. korstvorming en soms bloedverlies bij snuiten)
- Misselijkheid en braken
- Diarree
- Spierpijn
- Minder witte bloedcellen: verhoogde vatbaarheid voor infecties
- Minder rode bloedcellen (bloedarmoede)

## Aandachtspunten bij je behandeling:

- Het is belangrijk om te vermelden **welke andere geneesmiddelen** je neemt (ook als het gaat over voedingssupplementen, homeopathische middelen of vitaminen), want die kunnen mogelijk de werking van je behandeling beïnvloeden. Gelieve een overzicht van je thuismedicatie mee te nemen en te bespreken tijdens je volgende consultatie.
- Een **overgevoeligheidsreactie** kan optreden tijdens het toedienen van **Paclitaxel**. Mogelijke symptomen zijn huiduitslag, roodheid van het gelaat, een gevoel van benauwdheid, snelle hartslag, lage bloeddruk, koorts of rillingen, lage rugpijn. Ter preventie wordt steeds een voorbehandeling met dexamethasone en cetirizine voorzien. Merk je toch één van deze symptomen tijdens je behandeling? Waarschuw dan onmiddellijk je behandelend team.
- Bij gebruik van hand-voet-koeling, voornamelijk ter preventie van nagelveranderingen, breng je best een paar (oude) handschoenen en sokken mee, waarvan de laatste vinger- en teenkootjes afgeknipt zijn.
- **Paclitaxel**: Als dit geneesmiddel onbedoeld buiten het bloedvat terechtkomt (ook '**extravasatie**' genoemd), kan het weefselschade veroorzaken. Merk je pijn en/of een zichtbare zwelling op tijdens de toediening? Waarschuw dan onmiddellijk je behandelend team.



### Contacteer je behandelend team als een van de volgende problemen optreedt:

Koorts van 38°C of hoger of koude rillingen. Chemotherapie veroorzaakt een daling van de witte bloedcellen waardoor je vatbaarder en minder weerbaar bent tegen infecties. Bij koorts (temperatuur van 38°C of hoger) of koude rillingen is contact met het behandelteam aangewezen om een bloedname en nazicht in het ziekenhuis te organiseren.

## Contactgegevens Oncologisch Centrum Antwerpen

| Oncologisch centrum Antwerpen | <input type="checkbox"/> ZAS Augustinus | <input type="checkbox"/> ZAS Middelheim | <input type="checkbox"/> ZAS Palfijn |
|-------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
| Dagziekenhuis                 | 03 443 36 69                            | 03 280 40 12                            | 03 640 28 02                         |
| Verpleegafdeling              | 03 443 35 12                            | 03 280 34 72                            | 03 640 25 61                         |
| Consultatie                   | 03 443 37 37                            | 03 280 34 03                            | 03 640 28 13                         |
| Centraal nummer               | 03 443 30 11                            | 03 280 31 11                            | 03 640 21 11                         |
| Spoed                         | 03 443 39 00                            | 03 280 22 13                            | 03 640 20 00                         |