



# Mitomycine + 5-FU pomp (Mitomycine + Fluorouracil (5-FU))

Je arts heeft **mitomycine + 5-FU** voorgeschreven als onderdeel van je behandeling. We geven je in deze infofiche graag meer uitleg over de werking, het verloop en mogelijke bijwerkingen van je behandeling.

## Hoe werkt mijn behandeling?



**Chemotherapie:** Je krijgt geneesmiddelen toegediend die de **celdeling afremmen** en zo vooral snel delende cellen, zoals **kankercellen, zal beschadigen**. Deze soort geneesmiddelen worden ook cytostatica of celremmende geneesmiddelen genoemd. Bij deze behandeling gebruiken we de volgende cytostatica: mitomycine en 5-FU.

## Hoe verloopt mijn behandeling?

- De **behandeling** wordt toegediend op het **dagziekenhuis van het Oncologisch Centrum Antwerpen**.
- Je afspraak verloopt als volgt:



- Je behandeling wordt toegediend in periodes, die **cycli** worden genoemd. Een cyclus duurt **56 dagen**. Het totaal aantal cycli wordt steeds individueel bepaald door jouw arts op basis van het stadium van uitgebreidheid van de ziekte.
- Hieronder geven we je een overzicht van je **behandelschema**. Dit is een standaardschema. De behandel tijd en ondersteunende medicatie kan individueel wijzigen.

| Cyclus 1-... | Geneesmiddel      | Dag 1 | Dag 2-28 | Dag 29 | Dag 30-56 | Ter info                                                                                               |
|--------------|-------------------|-------|----------|--------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | Dexamethasone 8mg |       |          |        |           | Voorkomen van nevenwerkingen                                                                           |
|              | Spoelvloeistof    |       |          |        |           | Traag inlopend waakinfuus                                                                              |
|              | <b>Mitomycine</b> |       |          |        |           | <b>Therapie</b><br>Intraveneuze toediening over 15 minuten                                             |
|              | Spoelvloeistof    |       |          |        |           | Naspoelen van de leidingen                                                                             |
|              | <b>5-FU</b>       |       |          |        |           | <b>Therapie</b><br>Intraveneuze toediening met elastomeerpomp over 96 uur<br>Laten afkoppelen op dag 5 |

## Wat zijn mogelijke bijwerkingen van mijn behandeling?

Elke behandeling kan bijwerkingen veroorzaken. De ernst van de bijwerkingen is **afhankelijk van de gebruikte producten** en kan **individueel** verschillen. Volgende bijwerkingen zijn specifiek voor je behandeling:

- Minder witte bloedcellen: verhoogd risico op infecties
- Minder rode bloedcellen: vermoeidheid
- Minder bloedplaatjes: risico op bloedingen
- Verminderde eetlust
- Misselijkheid en braken
- Ontstoken mondslijmvlies
- Diarree
- Huiduitslag
- Haarverlies
- Hand-voetsyndroom
- Vertraagde wondgenezing
- Verhoging van het urinezuur

## Aandachtspunten bij je behandeling:

- Het is belangrijk om te vermelden **welke andere geneesmiddelen** je neemt (ook als het gaat over voedingssupplementen, homeopathische middelen of vitaminen), want die kunnen mogelijk de werking van je behandeling beïnvloeden. Gelieve een overzicht van je thuismedicatie mee te nemen en te bespreken tijdens je volgende consultatie.
- We raden je aan om tijdens en na je behandeling voldoende **water te drinken**.
- Bij chemotherapie worden er schadelijke producten via de **urine en stoelgang** afgescheiden. Dit kan tot 7 dagen na de behandeling. Tijdens deze periode neem je best voorzorgmaatregelen om contaminatie te vermijden. Daarom raden we aan om zittend te plassen en steeds twee maal het toilet door te spoelen met een gesloten deksel.



### Contacteer je behandelend team als een van de volgende problemen optreedt:

- Koorts van 38°C of hoger en/of koude rillingen. Chemotherapie veroorzaakt een daling van de witte bloedcellen waardoor je vatbaarder en minder weerbaar bent tegen infecties. Bij koorts (38°C of hoger) of koude rillingen is contact met het behandelteam aangewezen. Zo kan er een bloedafname en nazicht in het ziekenhuis gebeuren.
- Meer dan 24 uur hevig braken
- Meer dan 48 uur diarree
- Extreme vermoeidheid of kortademigheid
- Pijnlijke mond of keel

## Contactgegevens Oncologisch Centrum Antwerpen

| Oncologische centrum Antwerpen | <input type="checkbox"/> ZAS Augustinus | <input type="checkbox"/> ZAS Palfijn |
|--------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
| Dagziekenhuis                  | 03 443 35 07                            | 03 640 28 02                         |
| Verpleegafdeling               | 03 432 60 00 (D1)<br>03 443 35 02 (D2)  | 03 640 25 61                         |
| Consultatie                    | 03 443 37 37                            | 03 640 28 13                         |
| Centraal nummer                | 03 443 30 11                            | 03 640 21 11                         |
| Spoed                          | 03 443 39 00                            | 03 640 20 00                         |

ZAS vzw • Kempenstraat 100, 2030 Antwerpen • BE 0862.382.656 • RPR Antwerpen  
Erkenningsnummer 7/10009/31/000: ZAS Cadix, ZAS Elisabeth, ZAS Erasmus, ZAS Hoge Beuken, ZAS Joostens, ZAS Middelheim, ZAS Palfijn, ZAS Paola, ZAS Polikliniek Regatta, ZAS UKJA • Erkenningsnummer 7/10099/38/000: ZAS Augustinus, ZAS Polikliniek Hof ter Schelde, ZAS Sint-Jozef, ZAS Vincentius • Erkenningsnummer 7/20998/03/000: ZAS PZ Stuivenberg • Erkenningsnummer 7/25047/28/000: ZAS PVT Antwerpen