



Starten met 5-ASA bij IBD
Claversal[®] - Colitofalk[®] - Pentasa[®]
Informatiebrochure voor patiënten





ZIEKENHUIS *aan*
de STROOM

Wat Is 5-ASA?

01

Hoe verloopt de behandeling?

02

Wat is het effect, doel en verloop van deze behandeling?

03

Mogelijke nevenwerkingen

04

Zwangerschap en borstvoeding

05

Wat Is 5-ASA?

Medicatie met de werkzame stof 5-ASA (5-aminosalicyl-zuur) wordt gebruikt om plaatselijk ontstekingen in de dunne en dikke darm te behandelen. Ze worden vooral gebruikt als onderhoudsbehandeling om een nieuwe opstoot te voorkomen.

Er zijn orale en rectale preparaten verkrijgbaar:

- Oraal (via de mond): tabletten, capsules of korrels. Deze medicatie heeft een maagsapresistent omhulsel waardoor de werkzame stof pas in de darm wordt afgegeven.
- Rectaal (via de anus): zetpil, schuim of lavement. Wordt rectaal ingebracht en is dus sneller op de plaats van afgifte, werkt sneller dan de orale preparaten.

Hoe verloopt de behandeling?

02

Voor de behandeling met 5-ASA preparaten moet er eerst een bloedname gebeuren omdat de medicatie niet mag opgestart worden bij ernstige lever- of nierinsufficiëntie.

Wat is het effect, doel en verloop van deze behandeling?

Je klachten wegnemen is ons eerste doel.

Het effect van deze medicatie kan optreden na 1 tot 6 weken.

3 maanden na de start van de behandeling wordt terug bloed genomen. Als je bloedwaarden in orde zijn, is een bloedafname 1 keer per jaar voldoende.

Over het algemeen geeft deze medicatie weinig neveneffecten. De meest voorkomende neveneffecten zijn:

- huiduitslag
- misselijkheid
- diarree
- hoofdpijn

Zwangerschap en borstvoeding

Bij een mogelijke zwangerschap of zwangerschapswens neem je contact op met je behandelend arts.

5-ASA preparaten mogen verdergezet worden tijdens de zwangerschap.

Vraag ook naar de brochure IBD-centrum VIA waarin je alle contactgegevens terugvindt.

ZIEKENHUIS aan de STROOM



Ziekenhuis aan de Stroom
[ZAS] is het netwerk van
ZNA en GZA Ziekenhuizen

