



Starten met 5-ASA

Informatiebrochure voor patiënten





ZIEKENHUIS aan
de STROOM

Erkenningsnummer 009: ZAS Cadix, ZAS Elisabeth, ZAS Erasmus, ZAS Hoge Beuken, ZAS Joostens, ZAS Middelheim, ZAS Palfijn, ZAS Paola (Kinderziekenhuis), ZAS UKJA (Universitaire Kinder- en Jeugdpsychiatrie Antwerpen) **Erkenningsnummer 099:** ZAS Augustinus, ZAS Sint-Jozef, ZAS Vincentius **Erkenningsnummer 998:** ZAS PZ Stuivenberg (Psychiatrisch Ziekenhuis) **Erkenningsnummer 039:** ZAS PVT Antwerpen (Psychiatrisch Verzorgingstehuis) **Zijn ook deel van ZAS:** ZAS Medisch Centrum Kaai 142, ZAS Polikliniek Hof ter Schelde, ZAS Polikliniek Regatta, ZAS Plantin, ZAS Magazijn Luchtbal, ZAS Magazijn Terbeke

Wat Is 5-ASA?

01

Hoe verloopt de behandeling?

02

Wat is het effect, doel en verloop van deze behandeling?

03

Mogelijke nevenwerkingen

04

Zwangerschap en borstvoeding

05

Wat Is 5-ASA?

Medicatie met de werkzame stof 5-ASA (5-aminosalicyl-zuur) wordt gebruikt om plaatselijk ontstekingen in de dunne en dikke darm te behandelen. Ze worden vooral gebruikt als onderhoudsbehandeling om een nieuwe opstoot te voorkomen.

Er zijn orale en rectale preparaten verkrijgbaar:

- Oraal (via de mond): tabletten, capsules of korrels. Deze medicatie heeft een maagsapresistent omhulsel waardoor de werkzame stof pas in de darm wordt afgegeven.
- Rectaal (via de anus): zetpil, schuim of lavement. Wordt rectaal ingebracht en is dus sneller op de plaats van afgifte, werkt sneller dan de orale preparaten.

Hoe verloopt de behandeling?

02

Voor de behandeling met 5-ASA preparaten moet er eerst een bloedname gebeuren omdat de medicatie niet mag opgestart worden bij ernstige lever- of nierinsufficiëntie.

Wat is het effect, doel en verloop van deze behandeling?

Je klachten wegnemen is ons eerste doel.

Het effect van deze medicatie kan optreden na 1 tot 6 weken.

3 maanden na de start van de behandeling wordt terug bloed genomen. Als je bloedwaarden in orde zijn, is een bloedafname 1 keer per jaar voldoende.

Over het algemeen geeft deze medicatie weinig neveneffecten. De meest voorkomende neveneffecten zijn:

- huiduitslag
- misselijkheid
- diarree
- hoofdpijn

Zwangerschap en borstvoeding

Bij een mogelijke zwangerschap of zwangerschaps-wens neem je contact op met je behandelend arts.

5-ASA preparaten mogen verdergezet worden tijdens de zwangerschap.

Vraag ook naar de brochure IBD-centrum VIA waarin je alle contactgegevens terugvindt.

Handwriting practice lines consisting of 20 horizontal dotted lines.

ZIEKENHUIS aan de STROOM